



- ❖ دردهای روماتیسمی: ۱۲۰۰ تا ۳۲۰۰ میلی گرم در روز، در ۳ یا ۴ دوز منقصم.
- برای کودکان زیر ۱۲ سال، شکل های دیگر این دارو از جمله شربت توسط پزشک معالج تجویز می شود.
- در افراد دچار نارسایی کبدی و کلیوی، مقدار دوز مصرفی باستی با تجویز پزشک صورت پذیرد.
- ث) عوارض جانبی:**

هر دارو به موارز اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته شود، اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد، در صورت بروز هریک از آنها با پزشک خود مشورت کنید:

  - ناراحتی های گوارشی، خم معده، خونریزی معده، تهوع، استفراغ، اسهال، نفخ، بیوست، دردهای شکمی، تشید کولیت و بیماری کرون، راش، ادم، سرگیجه، سرد و خستگی.
  - عوارض جانبی گوارشی و قلبی عروقی ابیپرو芬 با مصرف دوز پایین و در کوتاه مدت کاهش یافته و قابل کنترل می گردد.

- ج) تداخلات دارویی:**

این دارو تداخلات دارویی سیاری دارد که با مصرف دوزهای بالا اثرات خود را بیشتر نمایان می کند؛ لذا با پزشک و داروساز خود در مورد ادامه مصرف این دارو ابتلاء را بیماری نظیر اختلالات خونی، آسم، کولیت، نارسایی کلیه، کبد، کم خونی، تپش قلب، فشار خون، پورفیریا، ورم قوزک پا، حملات قلبی، لخته های خونی، زخم معده، ادم و لوپوس.

در صورت تداخلات این دارو در زیر آورده شده است:

  - فورمزامید، هیدروکلروتیازید، تربیامترن، آسپیرین، واکاربین، تیکلوبیدین، کاتپریل، آنتولول، لوزارتان، دیگوکسین، متور کسات، لیتیوم، کلیه کورتیکواستروئیدها، زیدوودین، تاکرولیموس، سیکلوسپورین، سیپروفلوکساسین، میغیریستون، کولستیرامن و فلورکوتازول.

- ج) موارد منع مصرف:**

  - سایقه حساسیت به ابیپرو芬 با هریک از جزوی اجزای تشکیل دهنده آن.
  - سایقه و اکنش های حساسیتی مثل آسم، کهپر، آنژیو ادم، رینیت بعد از مصرف ابیپرو芬، آسپرین و یا دیگر مسکن ها (NSAIDs).
  - سایقه خونریزی دستگاه گوارش یا سوراخ شدگی دستگاه گوارش (perforation) به دلیل مصرف بی رویه و خودسرانه مسکن ها (NSAIDs).
  - سایقه زخم معده و یا داشتن زخم معده فعل
  - در افراد با نارسایی قلبی کلاس چهار، نارسایی کبدی و کلیوی
  - در ۳ ماهه سوم بارداری.

- ح) مسمومیت دارویی:**

در صورت بروز مسمومیت، بیمار را وادر به استفراغ کرده و هرچه سریعتر به بیمارستان مسمومین منتقل کنید.

- خ) شرایط نگهداری دارو:**

  - دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
  - دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

- د) بسته بندی:**

شرکت داروسازی رها ابیپرو芬 را به صورت قرص، در بلیستر و درون جعبه به همراه بروشور بسته بندی و به بازار عرضه می نماید.

# Ibuprofen

## ایبوپروفن

**شکل دارویی:** قرص روکشدار ۴۰۰ میلی گرم

**دسته دارویی:** ضد التهاب غیر استروئیدی

**موارد مصرف و آثار درمانی:**

مسکن و خد التهاب، ضد دردهای روماتیسمی، انواع آرتربیت جوانان، دردهای ماهیچه ای، دردهای ضعیف تا متوسط نظیر دردهای قاعدگی، میگرن، دندان درد، تهی، درد و تب پس از اینسان سازی (اکسیناسیون)، دردهای بعد از عمل جراحی (الف) راهنمایی های عمومی:

آن دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

▪ در صورت ساقیه حساسیت به هر نوع دارو، غذا، ماده رنگی یا ماده محافظ.

▪ در صورت ابتلاء به بیماری هایی نظیر: اختلالات خونی، آسم، کولیت، نارسایی کلیه، کبد، کم خونی، تپش قلب، فشار خون، پورفیریا، ورم قوزک پا، حملات قلبی، لخته های خونی، زخم معده، ادم و لوپوس.

▪ در صورت مصرف هر گونه دارو از جمله سایمتیدین، پروتیسید، سالسیلات ها، داروهای ضد انعقاد، داروهای ضد فشار خون، داروهای محرك مغزی، سدیم والپرات، پنی سیلامین.

**(ب) مصرف در دوران بارداری و شیر دهنی:**

این دارو در گروه C از طبقه بندی FDA قرار دارد و در حاملگی بالاتر از ۳۰ هفته در گروه D قرار دارد. مصرف ابیپرو芬 در ۳ ماهه آخر حاملگی باعث آسیب به جینین می شود. لذا فقط با تجویز پزشک و با در نظر گرفتن عوارض (ریسک بسته شدن داکتوس آرتربیوزس) مصرف شود. به دلیل ترشح این دارو در شیر، مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

**(ب) هشدارها:**

▪ همانند دیگر مسکن ها (NSAIDs)، ابیپرو芬 نیز می تواند، علائم عفونت را مخفی نماید.

▪ از استفاده هم زمان ابیپرو芬 با دیگر مسکن هایی (NSAIDs) که سیکلو اکسیزناز II را مهار می کنند (از جمله سلکوکسیب، مفنامیک اسید و ناپروکسن)، بهتر است پرهیز گردد تا از خطر خونریزی دستگاه گوارش کاسته شود.

▪ مصرف این دارو شاید باعث خواب آلودگی شود.

▪ از نوشیدن الکل یا فرورده های دارویی حاوی الکل پرهیز نمایید.

▪ قرص ابیپرو芬 بهتر است خرد، شکسته یا جویده نشود تا از اسیب به مری و حلق جلوگیری شود.

**(ت) مقدار و نحوه مصرف دارو:**

▪ مقدار مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می کند، بهتر است این دارو همراه با یک لیوان بر از آب میل شود.

▪ ابیپرو芬 کم ریسک ترین داروی ضد درد غیر استروئیدی می باشد.

▪ در بزرگسالان مقدار مصرف دارو:

▪ درد، تب و دردهای قاعده‌گی: ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی گرم هر ۴ تا ۶ ساعت (در صورت نیاز) تا حداقل ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ میلی گرم در روز.