

(ت) مقدار و نحوه مصرف دارو :

بزرگسالان : دو قرص هر ۶-۴ ساعت که نباید از ۸ قرص در ۲۴ ساعت تجاوز کند .

(ث) عوارض جانبی:

این دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، اگر چه همه این عوارض اتفاق نمی افتد، در صورت بروز ممکن است نیاز به توجه پزشکی داشته باشند :

حساسیت، تحریک سیستم اعصاب مرکزی در بیماران حساس از جمله هیجان، عصبی شدن، بی قراری، سرگیجه، ضعف یا بی خوابی، اختلالات خونی و کبدی

(ج) مسمومیت دارویی :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده، سریعاً به پزشک و یا مرکز درمانی مراجعه نمایید.

(چ) شرایط نگهداری دارو :

❖ دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.

❖ دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

(ح) بسته بندی :

شرکت داروسازی رها ترکیب استامینوفن و فنیل افرین هیدروکلراید را به شکل قرص دولایه به رنگ زرد و سفید خط دار، با آرم RAHA در یک طرف، تولید نموده و به صورت پلیسترهای ۱۰ عددی به همراه بروشور بسته بندی و به بازار عرضه نموده است.

هر قرص حاوی ۵۰۰ میلی گرم استامینوفن و ۵ میلی گرم فنیل افرین هیدروکلراید میباشد.

(P.2)

Raha Cold Day®

رها کلد روز®

ترکیبات : استامینوفن ۵۰۰ میلی گرم - فنیل افرین هیدروکلراید ۵ میلی گرم

شکل دارویی : قرص

دسته دارویی : آنالژزیک (ضد درد غیر مخدر) و دکونژستان

موارد مصرف و آثار درمانی : ضد درد، ضد تب، ضد احتقان، ضد آب ریزش

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است ، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید .

(الف) راهنمایی‌های عمومی :

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید :

۱- در صورت سابقه حساسیت به هر یک از مواد موثره دارو شامل استامینوفن، فنیل افرین، هر نوع غذا و یا هر نوع ماده افزودنی.

۲- در صورت ابتلا به بیماریهای ویروسی کبدی، الکلیسم، بیماریهای قلبی، گلوکوم، افزایش فشارخون.

۳- در صورت مصرف داروهای آنتی کولینرژیک از جمله هیوسین و آتروپین، الکل، ضد افسردگیهای سه حلقه ای، داروهای مهار کننده آنزیم مونو آمینواکسیداز از جمله ترانیل سیپرومین و داروهای آمینی سمپاتومیمتیک، سایر فرآورده های حاوی استامینوفن، فورازولیدون، وارفارین یا دیگوکسین.

(ب) مصرف در دوران بارداری و شیر دهی :

هنگام بارداری تنها با تجویز پزشک مصرف شود . در زمان شیردهی منع مصرف دارد . (گروه C)

(پ) هشدارها :

۱- دارو را بیش از مقدار توصیه شده مصرف نکنید .

۲- این دارو در کودکان کمتر از ۱۲ سال مصرف نشود.

۳- در مصرف همزمان با سایر فرآورده های حاوی استامینوفن احتیاط شود.

۴- این دارو ممکن است باعث ایجاد بی خوابی گردد، لذا بهتر است چند ساعت قبل از خواب آن را مصرف کنید.

۵- از مصرف این دارو با ترکیبات الکلی خودداری کنید .

۶- در صورت فراموش کردن یک نوبت دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی رسیده باشد آن را مصرف نکرده و مقدار مصرف بعدی را نیز دو برابر نکنید.

۷- مصرف این دارو در بیماران مبتلا به فشار خون بالا و فشار چشمی بالا و گلوکوم با احتیاط صورت گیرد .

۸- در صورت مصرف داروهای ضد چاقی با پزشک خود مشورت کنید .

۹- از وسایل محافظت کننده در برابر آفتاب از جمله عینک آفتابی و کرم های ضد آفتاب استفاده نمایید .

(P.1)