



ت) مقدار و نحوه مصرف دارو :

مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می کند به منظور پیشگیری از عوارض گوارشی ، این دارو باید بعد از غذا خورده شود .

ث) عوارض جانبی:

این دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته ای نیز بشود. اگر چه در اغلب بیماران عارضه چندانی بروز نکرده و یا عوارض جزئی با ادامه درمان و تطبيق بدن با دارو بر طرف می شود. در صورت بروز بعضی از عوارض و ادامه یا تشدید آنها با پزشک مشورت کنید. کم خونی، ضعف، خستگی، بی اشتتهاي، تاری دید، سر درد، تهوع، تپش قلب، اسهال، درد عضلات، تنفس کوتاه و سطحی، سر درد، مزه فلزی در دهان، کاهش وزن.

ج) مسمومیت دارویی :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد تعیین شده و در صورتیکه مدت زیادی از خوردن دارو نگذشته باشد بیمار او دار به استفراغ نموده و سریعاً به بیمارستان منتقل نمایید.

ج) شرایط نگهداری دارو :

- ❖ دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
- ❖ دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

ح) بسته بندی :

شرکت داروسازی رها قرص متغورمنین را با نام تجاری رهامت[®]، به صورت بلیستر و در جعبه به همراه بروشور بسته بندی و به بازار عرضه می کند. هر قرص حاوی ۵۰۰ میلی گرم متغورمنین هیدروکلرايد می باشد.

2

TAB LFT MFM500/054.04

اصفهان، کلوووتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفاده، واحد ۱، مددجوی پستی: ۰۵۶۷-۰۵۴۵-۰۵۹، تلفن: ۰۱۰-۰۵۴۵-۰۵۷،
www.rahapharm.com



Rahamet[®] 500

Metformin HCl

رهامت[®] ۵۰۰

متغورمنین هیدروکلرايد

شکل دارویی : قرص روکش دار خط دار

دسته دارویی : آنتی دیابتیک (بی گوانید)

موارد مصرف و آثار درمانی :

دیابت نوع ۲ درمان افزایش وزن القا شده توسط داروهای آنتی سایکوتیک (off-label use)، سندروم تخمدان پلی کیستیک (off-label use). این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا نوصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

(الف) راهنمایی های عمومی :

- ❖ قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
- ۱. در صورت حساسیت به این دارو.

۲. در صورت مصرف همزان داروهای از قبیل سایمیدین، فورزماید، آمیلوراید، نیفتیدین، دیکوکسین، مورفین، پروکائین آمید، کینیدین، رانیتیدین، تریامتن اچ، والکوماسین، تری متورپرم و الکل.

۳. در صورت ابتلا به بیماریهای کبدی شدید یا مزمن، پرکاری یا کم کاری تیروئید، سابقه لاکتیک اسیدوز، نارسایی کلیوی، کمبود اکسیژن، اسهال، انسداد روده، تهوع، سوختگی شدید، کمای دیابتیک، عقوف شدید، جراحی سنتین، مصرف داروهای حاوی بد برای عکسبرداری و آنژیوگرافی.

ب) مصرف در دوران بارداری و شیر دهن :

مصرف دارو در دوران بارداری و شیر دهن با نظر پزشک باشد.(گروه B).

پ) هشدارها :

- ۱- دارو را طبق دستور پزشک مصرف کنید و در دوره درمان بطور منظم تحت نظر پزشک قرار گیرید.
- ۲- برای کنترل قند خون خود مرتب تحت نظر پزشک قرار گیرید.
- ۳- در مورد میزان فعالیتهای بدی و زخم گذاری خود با پزشک مشورت کنید.
- ۴- از پزشک خود آموزش ببینید که در موقع اضطراری چه اقدامی انجام دهد.
- ۵- قبل از انجام جراحی و یا آزمایشات پزشکی که نیاز به مصرف داروهای "کنتراست مدبی" برای عکسبرداری میباشد، مصرف متغورمنین راقطع نموده و ۴۸ ساعت بعد از آزمایش یا جراحی در صورت نرمال بودن عملکرد کلیه مجددًا مصرف دارو را بانظر پزشک شروع نمایید.
- ۶- در صورت بروز عل遁 اسهال، تفسی سریع و سطحی، درد عضلانی شدید، دل درد، خستگی، ضعف و خواب آلودگی، قند خون را کنترل کرده و به پزشک مراجعه کنید. در صورت استفراغ به پزشک اطلاع دهید.
- ۷- در مورد علامم افت قند خون و افزایش قند خون و راه های مقابله با آن در صورت بروز از مراکز مربوطه آموزش ببینید.
- ۸- در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو به محض به یاد آوردن مقدار فراموش شده را مصرف کنید ولی اگر زمان مصرف نوبت بعدی فراسیده باشد آنرا مصرف نکرده و مقدار مصرف بعدی را نیز دو برابر نکنید.

اصفهان، کلوووتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفاده، واحد ۱، مددجوی پستی: ۰۵۶۷-۰۵۴۵-۰۵۹، تلفن: ۰۱۰-۰۵۴۵-۰۵۷،
www.rahapharm.com

1