

- ۱۰- در صورت تشدید یا وحامت بیماری به پزشک مراجعه کنید.
- ۱۱- از آنجا که استعمال دخانیات اثرات این دارو را کاهش می‌دهد، در طی مصرف این دارو، سیگار نکشید.
- ۱۲- در صورتیکه یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن، آن را مصرف کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد از مصرف آن خودداری کنید و مقدار مصرف بعدی را نیز دو برابر نکنید.

**(ث) مقدار مصرف :**

**زخم دوازده:**

درمان: ۱۵۰ میلیگرم دو بار در روز و یا ۳۰۰ میلیگرم قبل از خواب.  
پیش گیری از عود بیماری: ۱۵۰ میلیگرم قبل از خواب.

**زخم فعال معده:**

درمان: ۱۵۰ میلیگرم دو بار در روز.  
پیش گیری از عود بیماری: ۱۵۰ میلیگرم قبل از خواب.  
افزایش ترشح اسید معده: ۱۵۰ میلیگرم دو بار در روز.  
رفلاکس معده به مری: ۱۵۰ میلیگرم دو بار در روز.

**(ج) عوارض جانبی :**

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته شود، اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی‌افتد در صورت بروز، ممکن است نیاز به توجه پزشکی داشته باشند.  
در صورت بروز هر یک از عوارض زیر سریع با پزشک خود تماس پیریزید:  
بی نظمی ضربان قلب، تب، گلودرد، خونریزی یا گلودری غیر عادی، تورم صورت، لب ها و زبان، درد قفسه سینه، تنگی نفس، احساس ضعف، درد شکمی شدید که ممکن است علامت پانکراتیت باشد، تغییر رنگ و حجم ادرار  
سایر عوارض زیر در صورتیکه ادامه پیدا کنند نیاز به توجه پزشکی دارند:  
تاری دید، بیوست، اسهال، سرگیجه، خشکی دهان یا پوست، سردرد، کاهش اشتها، تهوع یا استفراغ، بثورات جلدی.

**(ج) مسمومیت :**

بیمار را وادر به استفراغ کرده و سریعاً به بیمارستان مسمومین منتقل کنید.

**(ح) شرایط نگهداری :**

دارو را دواز دسترس اطفال نگهداری کنید.

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

**(خ) بسته بندی :**

شرکت داروسازی رها قرص رانیتیدین را به صورت بلیستر در جعبه به همراه بروشور بسته بندی و به بازار عرضه می‌کند. هر قرص حاوی ۱۵۰ میلیگرم رانیتیدین هیدرو کلراید می‌باشد.

# Ranitidine 150

## رانیتیدین ۱۵۰

**شکل دارویی :** قرص روکشدار

**دسته دارویی :** بلوك کننده گیرنده های هیستامینی<sub>۲</sub>

**اثر درمانی :** مهار کننده ترشح اسید معده

**(الف) موارد مصرف :**

پیش گیری و درمان زخم دوازده، زخم فعال معده، افزایش تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

**(ب) راهنمایی های عمومی :**

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- ۱- در صورت سابقه حساسیت به این دارو، سایمینیدین فاموتیدین یا نیز ایتیدین.
- ۲- در صورت مصرف هر نوع دارو از قبیل اوارفارین، تئوفیلین، دیازیام، ترکیبات سولفنتیل اوره، سیزایپراید، سواکرالفت، آنتی اسید، لیدوکائین، پروپر انول، پروکائین، آمید، فنی توئین، گلی پیزادید، داروهای ضد قارچ، تربازولام، NSAIDs و میدازولام.
- ۳- در صورت ابتلا به بیماریهای کبدی، کلیوی، ربوی و نقص ایمنی، پور فیری جاد، دیابت و سرطان معده.

**(ب) مصرف در دوران بارداری و شیر دهن:**

این دارو در طبقه بندی B از FDA قرار دارد. در بارداری و شیردهی با نظر و تجویز پزشک مصرف شود.

**(ت) هشدارها:**

- ۱- در صورت مصرف آنتی اسید همراه این دارو حتماً ۲ ساعت قبل یا بعد از مصرف این دارو از شربت آنتی اسید استفاده کنید.
- ۲- دوره درمان با این دارو را کامل کنید حتی اگر احساس بهبودی نمودید.
- ۳- درمان دراز مدت با رانیتیدین ممکن است باعث کمبوده ویتامین B<sub>12</sub> شود.
- ۴- سمیت کبدی نادر است ولی باید مد نظر باشد.
- ۵- در صورت نارسایی کلیه حتماً میزان دارو باید متصصف شود.
- ۶- در طی درمان رانیتیدین ALT، LDH، AST، BUN، بلی روین، الکالین فسفاتاز، به طور خفیف و برگشت پذیر افزایش می یابد. کراتینین نیز افزایش یافته، ولی BUN تغییری نمی کند.
- ۷- جواب مثبت کاذب برای پروتئین در ادرار با نوار آزمون ادراری ایجاد می کند.
- ۸- گرانولوسیتوپنی، پانسیتوپنی، لکوپنی برگشت پذیر و ترومبوسیتوپنی ممکن است در طی درمان با رانیتیدین ایجاد شود.
- ۹- از مصرف غذایها، نوشیدنی ها و داروهایی که باعث تحریک معده می شوند خودداری کنید.