

التهاب حلق و گلو (nasopharyngitis) ، خواب آلودگی ، سردرد، آنورکسیا (از دست دادن اشتها) ، افسردگی ، سرگیجه ، لرزش ، خستگی ، سرفه، بی قراری و اضطراب از بیشترین عوارض گزارش شده اند .

عوارض ذیل به ندرت گزارش شده اند : دردهای شکمی ، اسهال ، عدم هضم مناسب ، استفراغ ، تهوع ، راش ، خستگی ، کاهش تعداد پلاکت ها ، کاهش تعداد گلبولهای سفید ، کاهش یا افزایش وزن ، اقدام به خودکشی ، اختلالات روانی ، توهم ، خشونت، حملات پانیک ، فراموشی ، پارستزی ، عدم تمرکز، دو بینی ، تیرگی دید ، ریزش مو ، افزایش غیر عادی تست عملکرد کبدی ، آگزما ، ضعف ماهیچه ای ، درد در ماهیچه ها ، زخم .

ج) مقدار و نحوه مصرف دارو :

مقدار و نحوه مصرف دارو را پزشک تعیین میکند.

در صورت فراموش کردن یک دوز از دو برابر نمودن دوز بعدی اجتناب شود .

دارو را در ساعت معینی از روز مصرف نمایید .

چ) تداخلات دارویی :

استفاده همزمان این دارو با کاربامازپین و پروپنسید تداخل دارد .

ح) مسمومیت دارویی :

در صورت مصرف بیش از مقدار تعیین شده توسط پزشک، بیمار را به بیمارستان انتقال دهید .

خ) شرایط نگهداری دارو :

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کرده و از یخ زدگی محافظت نمایید.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید .

د) بسته بندی :

شرکت داروسازی رها لوتیراستام را با نام تجاری لوسیزر® به شکل قرص های روکش دار ۵۰۰ میلیگرمی در بلیستر های ۱۰ عددی به همراه بروشور ، بسته بندی و به بازار عرضه مینماید .

leveseizure® 500

levetiracetam

لوسیزر® ۵۰۰

لوتیراستام

شکل دارویی : قرص روکش دار ۵۰۰ میلیگرمی

دسته درمانی : ضد تشنج

موارد مصرف :

* تشنج میوکلونیک

* تشنج پارشیال Partial onset seizures

* تشنج اولیه جنرالیزه تونیک کلونیک

* بیماری دوقطبی ، مانیک یا میکس

* پیشگیری از میگرن

* تاردیو دیسکنزی

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

الف) راهنمایی های عمومی :

قبل از مصرف دارو در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید :

۱- در صورت سابقه حساسیت به این دارو

۲- در صورت مصرف هر گونه داروی دیگر

ب) مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

* این دارو در گروه C از گروه بندی FDA قرار دارد . مصرف در دوران بارداری فقط با تجویز پزشک انجام شود .

* این دارو در شیر ترشح می شود.

پ) موارد منع مصرف :

✓ سابقه حساسیت به این دارو

✓ سابقه بیماریهای کبدی و کلیوی

ت) هشدارها :

* از مصرف بی رویه بدون تجویز پزشک خودداری شود .

* از مصرف مشروبات الکلی و شربت های دارویی حاوی الکل خودداری شود .

* به دلیل تلخی دارو از جویدن یا خرد کردن قرص خودداری شود.

* در صورت کاهش رشد در کودکان مصرف کننده این قرص، به پزشک خود مراجعه کنید .

* مصرف این دارو در بلند مدت منجر به افسردگی میشود ، در صورت هر گونه احساس تغییر رفتار و خلق و خو ، به پزشک خود مراجعه کنید .

* مصرف این دارو منجر به خواب آلودگی می گردد .

ث) عوارض جانبی :

هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود . گرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد، ولی در صورت بروز ممکن است نیاز به توجه پزشکی داشته باشند.