



شرکت داروسازی رها
RAHA Pharmaceutical Co.

شرابط نگهداری دارو:

دارو را در مای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم نگهداری و از بخ زدگی محافظت نمایید.
دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها ویتامین B₁₂ را بصورت محلول شفاف قرمز رنگ به شکل آمپول ۱ میلی لیتری، درون جعبه و به همراه برگه راهنمای عرضه می نماید. هر میلی لیتر آمپول B₁₂ حاوی ۱۰۰۰ میکرو گرم سیانو کوبالامین می باشد.



شرکت داروسازی رها
RAHA Pharmaceutical Co.

Vitamin B₁₂ 1000

۱۰۰۰

شکل دارویی: آمپول ۱۰۰۰ میکرو گرم در ۱ میلی لیتر

دسته دارویی: ویتامین

مواد مصرف و آثار درمانی:

کمبود ویتامین B₁₂ در اثر سو جذب، به دنبال آنی پرنسپیوس، مشکلات گوارشی، جراحی دستگاه گوارش، رشد بیش از حد باکتریایی روده کوچک،
گاستر کتوسمی، عفونت کرم کدو، بد خیمی پانکراس یا روده، کمبود فولیک اسید

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری فرمایید.
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- سابقه هر نوع حساسیت به این دارو

- در صورت مصرف هر نوع دارو چه با نسخه و چه بدون نسخه پزشک.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی با تشخیص پزشک مجاز است.

هشدارها:

• بیمارانی که به سایر کوبالامین ها (که به طور طبیعی در غذا دریافت می شوند) عدم تحمل نشان می دهند، ممکن است ویتامین B₁₂ را نیز تحمل نکنند.
• سابقه ابتلا به بیماری لبر (Leber).

• دارو را طبق دستور پزشک مصرف نکنید. از مصرف بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک جدا خودداری کنید.

• اگر یک نوبت تزریق فراموش شد اهمیتی ندارد، زیرا مدت زمان طولانی لازم است تا این ویتامین از بدن تخلیه گردد.

• به علت وجود پنتیل الکل این دارو نباید در نوزادان نارس یا رسیده بکار رود. همچنین در افراد مبتلا به بیماری های کبدی یا کلیوی باید با مشورت پزشک مصرف گردد.

• شوک آنافلکتیک پس از تزریق آمپول ویتامین B₁₂ گزارش شده است. انجام تست پوستی (intradermal) قبل از تزریق در افراد مشکوک به حساسیت به این دارو، توصیه میگردد.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف این دارو را پزشک تعیین می کند.

عواض جانبی:

هر دارو به موارد اثرا مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، در صورت بروز عوارض جانبی زیر ضمن قطع دارو، با پزشک مشورت نمایید:

قلی: ادم ربوی، نارسایی قلی (CHF)، ترومیوزوریدی محیطی.

بوستی: خارش، بیورات جلدی زود گذر

علام دیگر: شوک آنافلکتیک، احسان نورم بدن، اسهال گذرا، پایی سیستمی و را

AMP.LFT.B12.1000/007.02

اصفهان، کلیووتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صنفه، واحد ۱، مندوبی پستی: ۸۱۷۴۵-۵۶۷-۰۶۹، تلفن: (+۹۸)۰۳۱-۳۵۶۵۴۰-۹۵۹، فکس: (+۹۸)۰۳۱-۳۵۶۵۴۰-۸۵۹

2

(Page 2)

AMP.LFT.B12.1000/007.02

اصفهان، کلیووتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صنفه، واحد ۱، مندوبی پستی: ۸۱۷۴۵-۵۶۷-۰۶۹، تلفن: (+۹۸)۰۳۱-۳۵۶۵۴۰-۹۵۹، فکس: (+۹۸)۰۳۱-۳۵۶۵۴۰-۸۵۹

1

(Page 1)