

آلروپات® 0.6 % Olopatadine

آلروپات® ۰/۶ درصد اولوپاتادین

شکل دارویی: اسپری بینی

دسته دارویی: آنتی هیستامین، آنتاگونیست گیرنده H₁

اثر درمانی: ضد احتقان، ضد آلرژی، ضد آبریزش بینی به دلیل آلرژی فصلی، درمان رینیت آلرژیک

راهنماییهای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید. قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید:

- ۱- در صورت سابقه حساسیت به این دارو
- ۲- در صورت مصرف هر نوع داروی دیگر اعم از گیاهی یا شیمیایی یا ویتامین و داروهای مکمل، به ویژه: داروهای خواب آور و آرام بخش، داروهای سرماخوردگی و ضد آلرژی، داروهای شل کننده عضلات و داروهای ضد تشنج و ضد افسردگی و ضد اضطراب، چون باعث تشدید خواب آلودگی میشوند.
- ۳- در صورت داشتن انحراف بینی، گرفتگی یا شکستگی بینی و سابقه جراحی بینی

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این دارو در گروه C قرار دارد؛ در صورت حاملگی یا قصد حامله شدن به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. بهتر است در دوران شیر دهی استفاده نشود.

هشدارها:

- * جهت ادامه درمان و تغییر دوز دارو حتماً به پزشک خود مراجعه کنید. دارو را بیشتر یا کمتر از مقدار تجویز شده توسط پزشک مصرف ننمایید و از قطع خودسرانه مصرف دارو خودداری کنید. به منظور بررسی پیشرفت درمان به طور منظم به پزشک مراجعه کنید.
- * مصرف این دارو برای بیشتر از هفت روز توصیه نمی شود و در صورت عدم بهبودی پس از یک هفته به پزشک مراجعه کنید.
- * داخل چشم و دهان اسپری نکنید.
- * دارو را بعد از تاریخ انقضا مصرف ننمایید.
- * از رانندگی و کار با ماشین آلاتی که نیاز به دقت کافی دارند، اجتناب نمایید.

عوارض جانبی:

این دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود گرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد ولی در صورت بروز، ممکن است نیاز به توجه پزشکی داشته باشند.
عوارض جانبی شامل خواب آلودگی، احساس طعم تلخ در دهان، سردرد، خشکی دهان، گلو درد، سرفه، عطسه، علائم سرماخوردگی، افزایش وزن، تهوع، اسهال و درد شکمی می باشد.
در صورت خونریزی بینی، ایجاد زخم در بینی، تب، احساس سوزش یا درد در ادرار، سریعاً مصرف این دارو را قطع نموده و با پزشک خود تماس بگیرید.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو برای بیماران مختلف، متفاوت است. مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین میکند. با این وجود مقدار مصرف معمول دارو به شرح زیر میباشد.
- بزرگسالان و افراد بالای ۱۲ سال: دو پاف در هرسوراخ بینی دو بار در روز.

1

- کودکان بین ۶ تا ۱۲ سال: یک پاف در هر سوراخ بینی دو بار در روز.

- کودکان زیر ۶ سال: مصرف در این گروه سنی توصیه نمیشود.

این دارو فقط با نسخه پزشک عرضه میشود و بیمار بایستی طبق دستور پزشک مصرف نماید.

برای اولین استفاده یا استفاده بعد از مدت طولانی که اسپری نکرده اید، ظرف اسپری را به خوبی تکان دهید (شکل ۱)، آن را مطابق شکل زیر نگه دارید (شکل ۲)

و ابتدا پنج بار اسپری را در هوا، دور از صورت، پاف کنید، تا قطرات مایع را در هوا ببینید.



(شکل ۱) (شکل ۲) (شکل ۳) (شکل ۴) (شکل ۵)

اسپری بینی به دلیل سیال بودن به سرعت به حلق منتقل می شود و بی اثر می گردد، بنابراین حتماً باید به روش صحیح از آنها استفاده نمود: ابتدا بینی را تمیز کنید و با قدرت، کل بازدم خود را از بینی خارج کنید. دست ها را بشوید، بنشینید و سر را کاملاً به عقب خم کنید یا اینکه دراز بکشید و بالش را زیر شانه ها قرار دهید. نوک اسپری را در یکی از سوراخ های بینی قرار دهید و با دست دیگر سوراخ دیگر بینی را بفشارید (شکل ۳)، مقدار داروی لازم را در سوراخ بینی اسپری کنید.

سپس فوراً سر را به سمت زانو خم کنید و چندین بار به آرامی سر را به چپ و راست تکان دهید. چند دقیقه به همین حالت باقی بمانید. نوک اسپری را با آب گرم و دستمال تمیز کنید (شکل ۴ و ۵).

در صورتیکه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید به محض بیدار آوردن در صورتیکه نزدیک مصرف دوز بعدی نباشد آن را اسپری کرده و از دو برابر کردن مقدار مصرف خودداری کنید.

مسمومیت دارو:

فوراً بیمار را به بیمارستان منتقل کنید. علائم مسمومیت، فرم شدید عوارض جانبی است.

شرایط نگهداری دارو:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای ۴ تا ۲۵ درجه سانتیگراد در ظروف دربسته نگهداری کنید. دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها آلروپات® (اولوپاتادین) را به شکل اسپری بینی در ظروف پلی اتیلنی ۲۰ میلی لیتری، درون جعبه و به همراه بروشور عرضه میکند.

هر پاف اسپری بینی حاوی ۶۶۵ میکروگرم اولوپاتادین هیدروکلراید می باشد. اسپری اولوپاتادین بی رنگ و بدون بو است.

2