

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف دارو برای بیماران مختلف متفاوت است. مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می کند.

- با این وجود مقدار مصرف معمول دارو برای بالغین به صورت یک قطره در هر چشم بیمار، دو بار در روز با فاصله حداقل ۶ تا ۸ ساعت می باشد.
- ایمنی و اثر بخشی این دارو در کودکان کمتر از ۳ سال به اثبات نرسیده است.
- کودکان بالای ۳ سال: همانند بالغین مصرف نمایند.

برای مصرف دارو سر را قدری به سمت عقب خم کنید. پلک پایین را با انگشت گرفته و مقداری به سمت جلو بکشید. (شکل ۱). یک قطره از محلول را در حفره پلک پایین بچکانید (شکل ۲). در حالی که سمت پایین را نگاه می کنید چشم را به آرامی ببندید (شکل ۳). به مدت ۳ تا ۵ دقیقه گوشه چشم خود را به کمک انگشت شست به سمت بینی فشار دهید. چشم را بسته نگه دارید و داروی اضافی خارج شده را با دستمال تمیز پاک کنید (شکل ۴).

از تماس نوک قطره چکان با چشم یا هر سطح دیگری خودداری کنید. در صورت استفاده از لنز تماسی نرم، قبل از مصرف دارو لنز را از چشم خود خارج نموده و ۱۵ دقیقه بعد از مصرف دارو مجدداً آن را در چشم قرار دهید. در صورت نیاز به استفاده از داروهای چشمی دیگر بین مصرف آن ها با این دارو ۱۰ دقیقه فاصله دهید. در صورت فراموشی مصرف یک دوز، دارو را به محض یادآوری مصرف کنید، ولی از دو برابر کردن مقدار مصرفی خودداری نمایید.



شرایط نگهداری:

دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید. دارو را در ظرف درب بسته نگهداری و یک ماه پس از باز شدن درپوش ظرف، باقیمانده دارو را دور بریزید. دارو را دور از دید و دسترس اطفال نگهداری نمایید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها آلروپات® را به شکل قطره چشمی در ظروف پلی اتیلنی ۵ میلی لیتری درون جعبه و به همراه برگه راهنما عرضه می کند. قطره اولوپاتادین بی رنگ و بدون بو است.

Aleropat®

Olopatadine

آلروپات®
اولوپاتادین

ترکیبات: اولوپاتادین هیدروکلراید ۵ میلی گرم در هر ۵ میلی لیتر

شکل دارویی: قطره استریل چشمی

دسته دارویی: آنتی هیستامین، آنتاگونیست گیرنده H₁

اثر درمانی: پیشگیری و درمان علائم کونژنکتیویت آلرژیک از جمله خارش چشم

راهنمایهای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

قبل از مصرف در صورت سابقه حساسیت به این دارو یا پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این دارو در رده C از طبقه بندی FDA قرار دارد. در صورت بارداری یا قصد باردار شدن به پزشک خود اطلاع دهید. در دوران شیردهی با احتیاط مصرف گردد.

هشدارها:

- از مصرف همزمان با لنزهای تماسی نرم خودداری کنید.

عوارض جانبی:

این دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. گرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد، ولی در صورت بروز ممکن است نیاز به توجه پزشکی داشته باشد.

عوارض با شیوع بالاتر عبارتند از: علائم شبه سرماخوردگی از جمله سوزش گلو، آب ریزش، سر درد و گلودرد، خشکی بینی، خستگی

عوارض با شیوع کمتر عبارتند از: قرمزی چشم یا داخل پلک، سرفه، کراتیت (قرمزی چشم، التهاب، درد)، تورم پلک، تهوع، رینیت، سینوزیت، خشکی چشم، تاری دید، سوزش خفیف چشم، احساس وجود جسم خارجی در چشم، احساس طعم نامطلوب در دهان، میدریاز، درمانیت تماسی، خشکی پوست.