شرکت داروسازی رها
RAHA Pharmaceutical Co.

Angipol® 47.5 ER

Metoprolol Succinate

آنـژیـپول® ۴۷/۵ پیوسته رهش

متوپرولول سوکسینات

شکل دارویی : قرص ۴۷/۵ میلی گرم پیوسته رهش (معادل ۵۰ میلی گرم متوپرولول تارتارات)

دسته درمانی : بتا بلاکر

اثر درمانی : متوپرولول در درمان آنژین صدری مزمن،کنترل فشارخون(به تنهایی یا همراه با سایر داروهای کاهنده فشار خون)، پیشگیری از انفارکـــتوس مجدد مـــیوکارد ، بـــرای حفاظت از قـــلب ، پیشگیری از سردردهای میگرنی و مشکلات تیروئیدی مصرف میشود.

الف) راهنماییهای عمومی :

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است ، لذا از مصـرف آن در موارد مشـابه و یا توصیه مصـرف آن به دیگران خودداری کنید . قبل از مصـرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید :

* در صورت سابقه حساسیت به این دارو یا دیگر داروهای بتا بلاکر مثل لابتالول ، کارودیلول ، سوتالول ، پروپرانول ، نادولول و نبیوولول .
* در صورت نیاز به مصرف سایر داروها از داروساز یا پزشک در مورد تداخل با متو پرولول سوال کنید . متو پرولول با داروهای زیر تداخل دارد :

بوپروپیون ، پرازوسین ، تربینافین ، کلومیپرامین ، دسیپرامین ، دولوکسـتین ، فلوکسـتین ، فلووکسـامین ، پاروکسـتین ، سرترالین ، ارگونووین ، ارگوتامین ، متیل ارگونووین ، آملودیپین ، کلونیدین، دیگوکســـین ، دیلتیازم ، دی‌پیریدامول ، هیدرالازین ، متیل دوپا ، نیفدیپین ، فنلزین ، سلژلین ، ورآپامین ، کینیدین ، لینزولید ، ترانیل سیپرومین ، ایزو کربوکســـازید ، کلوپرومازین ، فلوفنازین ، هالوپریدول، تیوریدازین

* بارداری یا دوران شیر دهی .
* مشکلات کبدی و یا کلیوی .
* فشار خون پایین یا مشکلات مربوط به گردش خون .
* آسم و سایر مشکلات تنفسی ، تنگی نفس و COPD
* بیماری های تیروئیدی .
* پسوریازیس (نوعی مشکل پوستی) .
* میاستنی گراویس (نوعی بیماری است که موجب ضعف عضلات می شود.)
* نارسایی قلبی (شرایطی که پمپاژ قلب کاهش یافته است و یا ضربان قلب ضعیف و نامنظم است) و نارسایی احتقانی قلب.
* آنژین پرینزمتال (واریانت) : نوعی درد قفسه سینه میباشد که علت آن اسپاسم عروق خون رسان به قلب می باشد.
* فئوکروموسایتوما (تومور غده آدرنال)
* مصرف سایر داروها (حتی داروهای گیاهی)
* سابقه حساسیت دارویی یا هرگونه سابقه حساسیتی شدید
* رعایت رژیم غذایی توصیه شده توسط پزشک، بسیار حائز اهمیت میباشد.
* توصیه میشود در طول مدتی که متوپرولول استفاده میکنید از نوشیدن الکل خودداری نمایید، زیرا الکل میتواند موجب بروز برخی از عوارض جانبی گردد.
* در صورتیکه دیابت دارید به طور مرتب قند خون خود را چک کنید، زیرا این دارو میتواند بر سطح قند خون تأثیر بگذارد. همچنین ممکن است علائم ناشی از افت قند خون را بپوشاند.
* اگر هرگونه جراحی دندان دارید، دندانپزشک خود را از مصرف متوپرولول مطلع سازید.
* مصرف دارو را بدون تجویز پزشک قطع نکنید. قطع ناگهانی دارو میتواند موجب بروز مشکلاتی گردد، لذا در صورت نیاز، پزشک به صورت تدریجی دوز دارو را کاهش میدهد.
* سعی کنید به طور مرتب به پزشک مراجعه نمایید، زیرا در این صورت روند درمان بهتر کنترل میشود.

ب) مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

جزء گروه C است و ممکن است به جنین آسیب برساند . در صورت شک به بارداری یا تصـــمیم به بارداری ، پزشک خود را مطلع سازید . متو پرولول در شیر ترشح میشـــود. برای جلوگیری از آسیب احتمالی حتماً با پزشک خود مشورت کنید .

پ) هشدارها

*جهت ادامه درمان و تغییر دوز دارو حتما به پزشک خود مراجعه کنید. دارو را بیشتر یا کمتر از مقدار تجویز شده توسط پزشک مصرف ننمائید و از قطع خودسرانه مصـــــرف دارو خودداری کنید. به منظور بررسی پیشرفت درمان به طور منظم به پزشک مراجعه کنید.

اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه ، واحد ۱۱ ، صندوق پستی: ۵۶۷- ۸۱۷۴۵ تلفن: ۳۶۵۴۰۶۵۹-۳۱(۹۸+)
(۹۸+)۳۱-۳۶۵۴۰۸۵۹ فکس: (۹۸+)۳۱-۳۶۵۴۰۹۵۹
www.rahapharm.com

(Page 1)

شرکت داروسازی رها
RAHA Pharmaceutical Co.

* مصرف این دارو در بیماران پایین تر از ۱۸ سال ممنوع است.
* مصرف این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان صورت گیرد: سابقه آلرژی، آسم،نایژه‌ای ، آمفیزم یا برونشیت غیر آلرژیک، نارسایی احتـــقانی قلب، دیابت، پرکـــاری تیروئـــید، افســـردگی یا سابقه ابتلاء به آن.
* مقدار مصرف این دارو در سالمندان باید بر اساس پاسخ بیمار تعیین شود. زیرا از یک طرف به علت کاهش حساسیت این بیماران به اثر دارو ممکن است افزایش مقـــدار مصرف لازم باشد و از طرف دیگر به علت کاهش توانایی متابولیسم و دفع دارو، کاهش مقدار مصرف ممکن است ضرورت یابد.
* در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه، مقادیر مصرف متوپرولول باید بر اساس شرایط بیمار تنظیم شود .
* درصورت بروز افسردگی ناشی از این دارو، مصرف آن باید قطع شود.
* اگر بعد از یک دوره درمان طولانی با این دارو قطع مصرف آن ضرورت پیدا کند، باید به تدریج و حداقل طی سه روز تا دو هفته مصرف دارو قطع شود. در طول این مدت، بیمار بایـــد از فعالیـــتهای شدید بدنی پرهیز کند تا خطر بروز انفارکتوس میوکارد یا آریتمی به حداقل برسد. اگر پس از قطع مصرف دارو، علایم قطع مصرف بروز کرد، باید مصرف دارو را به طور موقت مجدداً شروع نمود و به دنبال بهبود بیمار، مصرف دارو را با احتیاط قطع کرد.
* در طول مصرف این دارو، پیگیری عملکرد قلب، تعیین نبض، اندازه گیری فشار خون و ثبت نوار قلبی و اندازه گیری ضربان قلب ضروری است.
* این دارو در شوک قلبی، نارسایی آشکار قلب، بلوک قلبی درجه دو یا سه دهلیزی- بطنی، برادی کاردی سینوسی و کاهش فشار خون سیستولیک به کمتر از ۱۰۰ میلیمتر جیوه (برای پیشگیری از انفارکتوس مجدد میوکارد) نباید مصرف شود.
* هیچ یک از نوبتهای مصرف این دارو نباید فراموش شود، به خصوص اگر روزی یک بار مصرف میشود.
* این دارو، فشـــار خون بالا را درمان نمیکند، بلکه آن را کنترل مینماید. مصرف آن ممکن است تا پایان عمر ضروری باشد.
* مصرف دارو حتی در صورت احساس بهبودی باید ادامه یابد.
* در بیماران مبتلا به دیابت ، با مصرف این دارو ممکن است علائم کاهش قند خون پوشانده شده یا طولانی شود ، و یا غلظت قند خون افزایش یابد.
* از مصرف این دارو با سایر داروها، به ویژه داروهای مقلد سمپاتیک که نیاز به نسخه پزشک ندارند، باید خودداری شود.
* قبل از قطع مصرف دارو، باید با پزشک مشورت شود.
* تا زمانی که بیمار به پاسخ درمانی دارو عادت نکرده است، از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد اجتناب گردد.

ت) عوارض جانبی:

این دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض نا خواسته نیز بشود . گرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد ولی در صورت بروز ممکن است نیاز به توجه پزشکی داشته باشند .

* برادی کاردی علامتی ، سرگیجه ، اسپاسم برنش ، اشکال در تنفس یا خس خس سینه ، نارسایی احتقانی قلب ، تورم مچ پا و اندام های تحتانی ، تنگی نفس ، افســـــردگی و کاهش گردش خون محیطی، سردی دستها و پاها و کاهش میل جنسی با مصرف این دارو گزارش شده است .

ث) مقدار و نحوه مصرف دارو:

* دارو را دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف نمایید .
* برای اینکه مصرف دارو فراموش نشود سعی کنید دارو را در زمان های مشخص مصرف نمایید .
* در صورت فراموش کردن یک دوز دارو ، به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید مگر اینکه نوبت بعدی مصرف دارو نزدیک باشد . در این صورت از دو برابر کردن دوز بعدی خودداری نمائید .
* قرص را بطور کامل بلعیده و از جویدن ، خرد کردن یا نصف کردن آن خودداری نمائید .
* دارو را همراه یا بعد از غذا میل کنید .

ج) مسمومیت دارو :

اگر بیش از مقدار تجویز شده این دارو را مصرف کرده اید، فورا به بیمارستان مراجعه کنید. افت شدید فشار خون ، ضربان کند ، مشکلات قلبی ، مشکل در هدایت الکتـــریکی قلب ، تنـــگی نفس ، کبود شدن پوست ، افت قند خون ، سطح بالای پتاسیم در خون ، بیهوشی و کما از نشانه های مصرف دوزهای بیش از اندازه است.

چ) شرایط نگهداری دارو :

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد ، در ظروف در بسته نگهداری کنید. دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

ح) بسته بندی :

شرکت داروسازی رها قرص پیوسته رهش متوپرولول سوکسینات را با نام تجاری آنژیپول® در بلیستر به همراه بروشور و درون جعبه بسته بندی و به بازار عرضه می نماید.

* **هر قرص متوپرولول سوکسینات ۴۷/۵ حاوی ۴۷/۵ میلیگرم متوپرولول سوکسینات معادل ۵۰ میلیگرم متوپرولول تارتارات است.**

TAB.LFT.ANG47.5/063.04

اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه ، واحد ۱۱ ، صندوق پستی: ۵۶۷- ۸۱۷۴۵ تلفن: ۳۶۵۴۰۶۵۹-۳۱(۹۸+)
(۹۸+)۳۱-۳۶۵۴۰۸۵۹ فکس: (۹۸+)۳۱-۳۶۵۴۰۹۵۹
www.rahapharm.com

(Page 2)