

عوارض جانبی:

هر دارویی به موارات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته ای نیز بشود، اگرچه همه ی این عوارض در یک فرد رخ نمی دهد ولی در صورت بروز هر کدام از این عوارض با پزشک خود مشورت نمایید:

عوارض شایع: اسهال، تهوع، یبوست، سوء هاضمه، کمردرد، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، سردرد، گیجی.

عوارض با شیوع کمتر: راش پوستی، ریزش مو، هایپرگلاسمی، زخم گوارشی، عفونت مجاری ادراری، واکنشهای اذیاد حساسیت، التهاب کیسه صفرا، کلسیفیه شدن سنگ های صفراوی، افزایش کراتینین سرم، علائم شبه آنفلوآنزا، سرفه، برونشیت، فارنژیت، درد عضلانی اسکلتی، کاهش پلاکت، کاهش گلبول های سفید خون.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو را پزشک معالج تعیین می کند.

توصیه می شود این دارو همراه و یا بعد از غذا مصرف شود.

لازم است درمان با این دارو، سه الی چهار ماه بعد از حل شدن سنگ ها نیز ادامه یابد.

در سال اول درمان با این دارو لازم است تصاویر اولترا سوند از کیسه صفرا به فواصل شش ماه جهت بررسی پاسخ سنگ های صفراوی به درمان تهیه گردد.

تداخلات دارویی:

اورسوداکسی کولیک اسید با کلسیترامین، کلسیتیول و فرآورده های آنتی اسید حاوی آلومینیوم، داروهای ضد هیپرلیپیدمی به ویژه کلوفیبرات، استروژن ها، نئوماکسین و فرآورده های ضد بارداری خوراکی و پروژستین ها تداخل دارد.

موارد منع مصرف:

- در صورت حساسیت به این دارو و یا سایر اجزای فرمولاسیون
- التهاب حاد کیسه صفرا
- بیماری های التهابی و شریانی که در آن کولون، کبد و روده کوچک با گردش انتروهپاتیک نمک های صفراوی تداخل دارند.

شرایط نگهداری دارو:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید. دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها اورسوداکسی کولیک اسید را با نام تجاری بایلدکس® به شکل کپسول، در پلیستر عرضه می نماید.

Bildex® 300

Ursodeoxycholic Acid

بایلدکس® ۳۰۰

اورسوداکسی کولیک اسید

شکل دارویی: کپسول ۳۰۰ میلی گرم

دسته دارویی: حل کننده سنگ های صفراوی

موارد مصرف و آثار درمانی:

سنگ های صفراوی کلسیفیه نشده

پیشگیری از تشکیل سنگ های صفراوی در بیماران چاقی که کاهش وزن سریع دارند.

سیروز صفراوی اولیه

هشدارها و موارد احتیاط:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

- در صورت حساسیت به این دارو و همچنین فرآورده های حاوی اسیدهای صفراوی از مصرف این دارو خودداری نمایید.
- در صورت ابتلا به بیماری های کبدی مزمن (به جز سیروز صفراوی اولیه) از مصرف این دارو خودداری نمایید.
- در سیروز صفراوی اولیه، لازم است در ابتدا پارامترهای عملکرد کبدی شامل ALT، AST و GGT هر ۴ هفته به مدت سه ماه و سپس هر سه ماه ارزیابی شود.
- لازم است بیماران از رژیم غذایی حاوی مقادیر زیاد کلسترول و کالری اجتناب نمایند.
- این دارو برای سنگ های کلسترولی کلسیفیه شده، سنگ های رادیوپک (حاوی کلسیم) و یا سنگ های صفراوی پیگمانته رادیولوسنت و در هنگام عدم عملکرد صحیح کیسه صفرا کاربرد ندارد.
- در صورت بروز عوارض مربوط به سنگ های صفراوی نظیر فیستول کیسه صفرا به روده، انسداد مجاری صفراوی، کلانژیت، کوله سیستیت و پانکراتیت اورسوداکسی کولیک اسید نباید مصرف گردد.
- در صورت فراموش کردن یک دوز، به محض یادآوری آن را مصرف نموده و یا دوز بعدی را دو برابر مصرف ننمایید.
- از مصرف آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم (به دلیل احتمال تداخل با جذب دارو) خودداری نمایید.
- ایمنی و اثر بخشی دارو در کودکان به اثبات نرسیده است.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این دارو در گروه B از طبقه بندی FDA قرار دارد، با این وجود مصرف دارو در دوران بارداری توصیه نمی شود. در شیردهی نیز به دلیل عدم وجود شواهد کافی از ترشح به داخل شیر، مصرف آن باید با احتیاط صورت بگیرد.