

Budanose®

Budesonide

بودانوز® بودزوناید

بودزوناید ۶۴ میکروگرم در هر دوز

شکل دارویی : اسپری بینی

دسته دارویی : کورتیکواستروئید (به صورت استنشاقی از راه بینی)

موارد مصرف و آثار درمانی :

- ✓ رینیت (آبریزش بینی) آلرژیک فصلی و مزمن
- ✓ رینیت (آبریزش بینی) وازوموتور
- ✓ درمان پولیپ بینی

راهنمایی‌های عمومی :

- ❖ این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است ، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.
- ❖ اثر این دارو بعد از گذشت چند روز نمایان می شود.
- ❖ در صورتی که آثار بهبودی پس از دو هفته از شروع درمان مشاهده نشد ، مجدداً به پزشک خود مراجعه کنید .
- ❖ در درمان رینیت فصلی بهتر است دارو را قبل از مواجهه با آلرژن ها مصرف کنید.

موارد احتیاط و هشدارها :

- ❖ قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید :
- ❖ در صورت مصرف کورتیکواستروئیدها به علت سابقه آسم ، آلرژی یا راش پوستی
- در صورت ابتلا یا مواجهه با فرد مبتلا به سل ، ابله مرغان ، سرخک
- در صورت خونریزی شدید یا متعدد از بینی و یا افرادی که اخیراً دچار زخم ، جراحت و یا عمل جراحی بینی شده اند.
- ابتلا به گلوکوم یا آب مروارید
- ابتلا به عفونت چشم یا دیابت

- ❖ در صورت بروز علائم عفونت مانند تب حاد در حین مصرف دارو، حتماً به پزشک مراجعه کنید.
- ❖ در بیماری که دچار عفونتهای قارچی و ویروسی مجاری تنفسی هستند مصرف این دارو باید با احتیاط صورت گیرد.
- ❖ در بیماری که کورتیکواستروئید خوراکی به فرم استنشاقی تبدیل شده است، در صورتی که اختلالات محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال مورد انتظار باشد، بیمار باید پایش گردد.

- ❖ در درمان طولانی مدت رینیت فصلی لازم است، سلامت مخاط بینی هر ۶ ماه بررسی شود .
- ❖ در شرایط نارسایی و کاهش عملکرد کبد، حذف دارو از بدن به کندی صورت گرفته و غلظت آن در خون افزایش می یابد. در این شرایط لازم است بیمار از نظر ظهور عوارض جانبی کورتون ها پایش گردد.
- ❖ افزایش دوز و افزایش زمان مصرف ممکن است در برخی از افراد باعث بروز آثار ناخواسته ای شود، مانند: سندرم کوشینگ، علائم شبه کوشینگ، سرکوب آدرنال، تأخیر رشد در کودکان و نوجوانان، آب مروارید، گلوکوم، همچنین اختلالات روانی و رفتاری مانند مشکلات سایکوموتور، اختلال خواب، اضطراب، افسردگی و پرخاشگری (به خصوص در کودکان)

- ❖ در صورتی که در حین درمان بیمار دچار علائم بینایی مانند تاری دید و اختلال در دید گردد، چشم باید از نظر گلوکوم، آب مروارید و یا بیماری های نادری مانند کوریوریتینوپاتی مرکزی، توسط چشم پزشک بررسی شود .
- ❖ رشد کودکان در حین درمان با کورتیکواستروئید ها، مرتباً باید توسط پزشک پایش گردد.

مصرف در دوران بارداری و شیر دهی :

این دارو در گروه B از رده بندی FDA قرار دارد . عارضه خاصی بر روی جنین در دوران بارداری نشان نداده است . ترشح این دارو در شیر بسیار کم بوده و نوزاد به میزان بسیار کمی در معرض دارو قرار می گیرد .
مقدار و نحوه مصرف دارو :

بزرگسالان : رینیت آلرژیک : معمولاً دوز اولیه به صورت یک پاف صبح و شب ، و یا دو پاف صبح ها در هر سوراخ بینی می باشد . دوز اولیه می تواند تا ۲۵۶ میکرو گرم (۴ پاف) در روز باشد . در صورت مشاهده اثر مثبت، دوز نگهدارنده صبح ها یک پاف در هر سوراخ بینی است . درمان می تواند تا سه ماه ادامه پیدا کند . پولیپ بینی : صبح و شب یک پاف در هر سوراخ بینی

کودکان : برای کودکان زیر ۶ سال شواهد کافی از مصرف این دارو وجود ندارد و در کودکان بالای ۶ سال می تواند همانند بزرگسالان مصرف شود . ابتدا بطری را به خوبی تکان دهید. (تصویر ۱) درپوش بطری را بردارید. (تصویر ۲) در صورتی که دارو را برای اولین بار استفاده می کنید و یا مدت زیادی از آخرین دوره مصرف شما می گذرد، در حالی که سر افشانه را دور از خودتان نگه داشته اید، چندین بار عمل اسپری کردن را مطابق تصویر تکرار کنید تا محتویات به طور یکنواخت خارج شوند. (تصویر ۳) پیش از اسپری کردن داخل بینی، محتویات بینی خود را خارج کنید. (تصویر ۴) سر را کمی به جلو متمایل کنید (تصویر ۵). مطابق شکل یک سوراخ بینی خود را ببندید و سر افشانه را در سوراخ دیگر بینی قرار دهید و به تعداد مناسب اسپری کنید. همین کار را برای سوراخ دیگر بینی تکرار کنید. (تصویر ۶)



عوارض جانبی:

هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود ؛ اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ، در صورت مشاهده پزشک خود را مطلع سازید . این دارو عوارض جانبی مانند خونریزی از بینی ، زخم بافت مخاطی ، حساسیت ، شوک آنافیلاکسی ، تاری دید ، زخم و پرفوراسیون بینی ، اسپاسم عضلانی ، سرکوب آدرنال و تأخیر در رشد ، در پی دارد .

تداخلات دارویی :

این دارو بر روی آنزیم CYP3A4 تأثیر گذار است . بنابراین در مصرف طولانی مدت می تواند با برخی از داروهای مهارکننده آن مانند ایتراکونازول ، کتوکونازول ، کلاریترومایسین ، مهارکننده های آنزیم پروتئاز HIV (مانند ایندیناویر) تداخل ایجاد کرده و عوارض کورتیکواستروئیدی دارو افزایش می یابد . در مطالعات ، این دارو تأثیری بر داروهای کنتراستپیتیو با دوز کم نشان نداده است .

موارد منع مصرف :

در صورت سابقه حساسیت به دارو یا سایر مواد جانبی موجود در محصول .

شرایط نگهداری دارو :

دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید و از یخ زدگی محافظت کنید .

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید .

✓ یک ماه پس از باز شدن درپوش ظرف، باقیمانده را دور بریزید.

✓ از قرار دادن دارو در یخچال خودداری ننمائید.

بسته بندی :

شرکت داروسازی رها اسپری بینی بودزوناید را با نام تجاری بودانوز® درون جعبه به همراه برگه راهنما بسته بندی و به بازار عرضه می نماید .