

Calcifun®-Plus

کلسی فان® - پلاس

ترکیبات :

Calcium (as carbonate)	600 mg	Manganese (as sulfat).....	1.8 mg
Magnesium (as oxide).....	50mg	Vitamin D ₃	800 IU
Zinc (as oxide).....	7.5 mg	Boron (as boric acid).....	250 mcg
Copper (as sulfate).....	1mg		

شکل فرآورده : قرص روکشدار

مواد جانبی : مالتودکسترین-دی کلسیم فسفات-کراس کارملوز سدیم-پویدون-میکرو کریستالین سلولز-کلونیدال سیلیکون دی اکساید-منیزیم استنارات-پلی اتیلن گلیکول-سدیم لوریل سولفات-تالک-تیتانیوم دی اکساید-رنگ آبی ایندیگو کارمین-رنگ صورتی اریتروزین

دسته بندی : مکمل

موارد مصرف :

❖ کمک به سلامت استخوان ها

راهنمایی های عمومی :

❖ این فرآورده جهت پیشگیری، تشخیص و درمان نمی باشد.

❖ قبل از مصرف این مکمل در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید:

۱) در صورت سابقه حساسیت به این فرآورده

۲) در صورت مصرف داروهای دیگر

مصرف در دوران بارداری و شیر دهی :

مطالعاتی بر روی مصرف این فرآورده در دوران حاملگی انجام نشده است، به نظر نمی رسد مصرف میترال ها برای جنین مضر باشد. در طول بارداری و شیردهی نیاز بدن به کلسیم و ویتامین D افزایش می یابد.

جهت مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی، با پزشک خود مشورت کنید.

هشدارها :

در صورت مصرف همزمان این فرآورده با تترا سایکلین ها، فلوروکینولون ها، فلوراید و بیس فسفونات ها، فاصله ۳ الی ۴ ساعت را بین آن ها رعایت نمائید.

در دوره مصرف این فرآورده، از مصرف فرآورده های حاوی ویتامین D و کلسیم پرهیز نمائید.

مشروبات الکلی و استعمال دخانیات و غذاهای حاوی مقادیر بالای فیبر و کافئین باعث کاهش جذب کلسیم می شوند.

سطح الکترولیت سرم بیماران مبتلا به نارسایی کلیه مانیتور گردد.

در موارد ذیل فرآورده با احتیاط مصرف گردد:

❖ در صورت دهیدراسیون، اسهال و عدم تعادل الکترولیت های سرم

❖ در صورت وجود اختلالات مزمن معده و روده

❖ در بیماران با نقص عملکرد کلیه یا هیپرکلسیوری

مقدار و نحوه مصرف :

بطور معمول مصرف این فرآورده به صورت ۱ تا ۲ قرص در روز، پس از غذا می باشد.

مصرف این فرآورده در افراد کمتر از ۱۸ سال توصیه نمی شود.

فرآورده را همراه با یک لیوان پر از آب مصرف نمائید.

موارد منع مصرف :

سابقه حساسیت به این فرآورده.

هیپرکلسمی (در اثر میلوما، متاستاز استخوانی و یا دیگر بیماری های بدخیم استخوان، سارکوئیدوز، هیپرپاراتیروئیدیسم و ویتامین دی بالای سرم.

نقص عملکرد کلیوی شدید و یا سابقه سنگ کلیه)

هیپرکلسی اوری

عوارض جانبی:

تهوع، اسهال و یا یبوست، راش پوستی و معده درد ناگهانی، ضعف عضلانی و هیپرکلسمی را می توان از عوارض نادر این فرآورده دانست، در صورت شدید شدن عوارض به پزشک مراجعه نمائید.

تداخلات :

این فرآورده با داروهای با مکمل های ذیل تداخل دارد:

دیگوکسین، آنتی اسیدهای حاوی کلسیم، آلومینیم یا منیزیم، مکمل های کلسیم و ویتامین دی، تترا سایکلین، داکسی سایکلین، ماینو سایکلین، اکسی تترا

سایکلین، دیورتیک های تیازیدی، بیس فسفونات ها، کلسی تونین، کورتیکو استروئیدها.

مسمومیت :

احتمال مسمومیت با مصرف این فرآورده کم است.

شرایط نگهداری :

فرآورده را دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و درون ظرف در بسته نگهداری کنید. فرآورده را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

بسته بندی :

شرکت داروسازی رها کلسی فان® - پلاس را به صورت قرص های روکشدار در ظروف پلی اتیلنی به همراه بروشور، درون جعبه بسته بندی و به بازار عرضه می کند.