

- در اطفال ، سالمندان و یا در صورت ابتلا به کاتاراکت، گلوکوم، دیابت ، هریس و سل با احتیاط مصرف شود.
- در صورت وجود عفونت یا آتروفی در محل درمان، از مصرف این دارو خودداری نمایید.
- مصرف این دارو در ناحیه صورت، زیر بغل یا کشاله ران توصیه نمیگردد.
- در صورت استعمال بر روی پوست صورت، درمان نباید بیش از ۵ روز به طول بینجامد.
- از مصرف این دارو برای درمان آکنه و لگاریس، روزانه یا درمانیت اطراف دهان خودداری نمایید.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

- مقدار دقیق مصرف توسط پزشک و بر اساس شرایط بیمار تعیین میگردد اما بطور معمول پماد کلوبتازول به صورت دو بار در روز مصرف میگردد.
- دارو را به صورت یک لایه نازک روی موضع بمالید.
- دارو را دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف نمائید.
- از تماس دارو با چشم و اطراف آن خودداری نمائید.
- پس از هر بار مصرف درپوش تیوب را محکم ببندید.
- مصرف در افراد زیر ۱۲ سال مگر در صورت صلاحدید و تجویز پزشک توصیه نمیشود.

عوارض جانبی:

هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. گر چه همه این عوارض اتفاق نمی افتد ولی در صورت بروز ممکن است نیاز به توجه پزشکی داشته باشند.

واکنش های درمانیت تماسی (سوزش ، خارش) ، بی حسی در انگشتان دست و یا پا، افزایش تحریک پذیری پوست، آتروفی پوست، پورپورا، تاول، فولیکولیت، پوستول، وزیکول ، عفونتهای ثانویه پوست و تلائرکتازی، واکنش های حساسیتی و راش، سرکوب محور HPA ، نازکی پوست ، خشکی پوست، قرمزی، کهیر، آکنه، احساس درد و سوختگی در موضع، دوبینی.

شرایط نگهداری دارو :

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمائید.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمائید.

بسته بندی :

شرکت داروسازی رها پماد کلوبتازول ۰/۰۵ درصد را در تیوبهای ۱۵ گرمی و درون جعبه عرضه می نماید.

2

کلوبتازول Clobetasol

ترکیبات: کلوبتازول پروپیونات

شکل دارویی : پماد موضعی ۰/۰۵ درصد

دسته درمانی : آدرنوکورتیکوئید موضعی ، ضدالتهاب

موارد مصرف: درمان التهاب در درماتوزهای حساس به کورتیکواستروئیدها، درمان موضعی کوتاه مدت پسوریازیس پلاک دار خفیف تا متوسط، التهاب و خارش متوسط تا شدید در درماتوز پاسخ دهنده به کورتیکواستروئید، اگزما ، درماتیتها، لیکن پلان، پمفیگوس، پمفیگوئید

راهنمایهای عمومی : قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید :

- ✓ در صورت سابقه حساسیت به این دارو
- ✓ در صورت مصرف هر گونه داروی دیگر
- ✓ اگر دچار عفونت پوستی هستند یا ناحیه ای از پوست شما نازک شده و آتروفی گردیده است و در صورت ابتلا به perioral dermatitis و rosacea
- ✓ در صورتی که اخیراً به سرخک، سرخچه، سل، آبله مرغان و زونا مبتلا شده اید و یا واکسن علیه این بیماریها دریافت کرده اید.
- ✓ در صورت مبتلا بودن به مشکلات گردش خون موضعی و سیستمیک
- ✓ در صورت عدم بهبود علائم و یا بدتر شدن

مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

کلوبتازول در گروه C از طبقه بندی FDA قرار داشته و احتمالاً اثرات تراتوژن دارد و بهتر است مصرف نشده و یا با صلاحدید پزشک متخصص مصرف شود.

هشدارها :

- مصرف مداوم طولانی مدت یا نا به جای استروئیدهای موضعی می تواند منجر به بروزالتهاب عود کننده پس از توقف درمان شود (سندروم قطع مصرف استروئید موضعی). یک فرم از التهاب عودکننده می تواند به صورت درمانیت همراه با قرمزی شدید، درد و سوزش بروز پیدا کند که تا اطراف محل اولیه ی درمان گسترش یابد. این واکنش زمانی که استروئید موضعی در نواحی دارای پوست حساس و نازک مثل صورت و نواحی چین دار مصرف شود، بیشتراحتمال دارد رخ دهد.تکرار این شرایط به صورت واکنش پس از قطع مصرف دارو ، طی روزها تا هفته های پس از درمان موفقیت آمیز باید در نظر گرفته شود.در این موارد توصیه می شود استعمال مجدد استروئیدهای موضعی همراه با احتیاط و به توصیه ی پزشک انجام شود و یا داروی دیگری جایگزین گردد.
- جذب سیستمیک کورتیکواستروئیدهای موضعی موجب مهار برگشت پذیر محور هیپوتالاموس-هیپوفیز- آدرنال شده ، لذا در مصرف دراز مدت و یا مقادیر زیاد علائم سندرم کوشینگ، هیپرگلیسمی و گلوکزوری در برخی بیماران دیده می شود.
- مصرف موضعی این پماد در دوران بارداری و یا شیردهی بخصوص به مدت طولانی و یا در نواحی وسیع و یا مقادیر زیاد و یا در اطراف پستان بخصوص قبل از شیردهی توصیه نمی شود.

1