



عوارض جانبی:

هر دارو به مواد اثراگذار درمانی مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته‌ای نیز بشود. اکرچه همه این عوارض اتفاق نمی‌افتد ولی در صورت بروز هر یک از آن‌ها پژوهش خود مشورت نمایید:

شایع ترین: بی‌حالی، خستگی، نهوع، استفراغ، گیجی، بی‌قراری، دردهای غیرعادی نورالریثک
همه ترین: آنچه آپلاستیک، آکراؤلوفسیتوز، کاهش موقت یا دائمی پلاکت یا شمارش گلبول‌های سفید خون
ساخروا عوارض: سعیت CNS، تاری دید، دوینی، نیستاتگموس، کدروت نقطه‌ای قشر عصبی

عوارض نادر: واکنش های آگرژسک، سندرم استیتون - جانسون، نکروز سمعی اپیدرم، اضطراب، آناکسی، تغییرات رفتاری در کودکان، در قفسه سینه، فقدان حس شخصیت، اسهال، علائم اکستیریاراپیدال، هیپو ناترمی، مسمومیت با آب، عفونت، افسردگی همراه با آریتاپسیون، تعامل به خودکشی، سندرم شبیه لوپوس اریتماتور، متنتز آسپتیک همراه با میوکالونوس

مسامویت دارویی:

در صورت مصرف دارو بیش از مقدار تجویز شده، بیمار را به بیمارستان منتقل نمایید.

تخالخات دارویی:

قبل از مصرف دارو، پژوهش یا دارو ساز خود را از مصرف هرگونه دارو مطلع سازید. بسیاری از داروها با مصرف کارباپین دچار کاهش با افزایش غلظت پلاسماجی هی شوند. در لیست زیر به اختصار نام برخی از داروها که ایجاد داخل هی کنند، اورده شده است:
توفیلین، داروهای ضد بارداری و داروهای هورمونی، برخی آنچه بیوپیک ها از جمله هاکرولیدها، داروهای ضد قارچ مثل فلوكونازول و کنکوکوتاول، وارفارین، داروهای ضد سرطان از جمله سیپسیلاتین و ...، داروهای ضد فشار خون مثل دیلیتیازم و ...، داروهای پیوندی مثل پردنیزولون و تاکرولیموس، سیکلوسپورین و غیره، داروهای استروئیدی از جمله دی‌کژا-متارون و ...، داروهای جایگزین تیروئید از جمله لووپیروگسین.

برای اطلاع دقیق از نوع تداخل و شدت آن با پژوهش خود مشورت نمایید. در برخی مواد با تنظیم دوز و صلاحیت پژوهش مصالح، مصرف همزمان هشکن ندارد.

شرابط نگهداری:

دارو را دور از نور، رطوبت و در درمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از بیخ زدگی محافظت نمایید.
دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها کارباپین ۲۰۰ میلی گرم، همراه با برگه راهنمای و درون جعبه بسته بندی و به بازار عرضه می‌نماید.

کارباپین ۲۰۰

شکل دارویی: قرص روکشدار ۲۰۰ میلی گرم

دسته درمانی: ضد تشنج، ضد دردهای نوروپاتی

مواد مصرف آنال درمانی:

صرع کمپلکس پارسیوال، تونیک کلونیک، صرع های میکس، نورالری عصب سه قلو، موارد تثبیت نشده در اختلالات مانیا و اسکیزوفرنی، ضد تشنج، آنچه دیوژنیک، آنچه مانیک، آنچه سایکوتیک، ضد نورالری.

رهانهای های عمومی:

این دارو برای بیماری‌های فعلی شما تجویز شده است؛ اذ از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پژوهش یا داروساز خود مشورت نمایید:

- اکس کارباپین در صورت سایه داشتن انواع دیگر صرع (ابسنس و آنونیک) در صورت سایه افزایش فشار چشم (کلوكوم) در صورت سایه اختلالات کلیوی و کبدی، رفتاری و ذهنی، افکار خودکشی یا MS در صورت سایه اختلالات خونی و اختلال قلبی یا کبدی در اثر مصرف داروهای دیگر در صورت سایه تیزیکی وجود یا عدم وجود یا کبدی درمان کارباپین

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این دارو درده D از طبقه بندی FDA قرار دارد. در صورت نیاز به مصرف، فواید و مضرات دارو توسط پژوهش بررسی و مقایسه گردد. کارباپین در شیر نیز ترشح می‌شود.

مشدادرها:

- جهت ادامه درمان و تغییر دوز دارو، حتماً با پژوهش خود مشورت نمایید. از قطع ناگهانی و کاهش دوز دارو خودداری نمایید. این دارو ممکن است باعث ایجاد خواب آودگی گردد، لذا ضمن درمان، از رانندگی و کارهایی که نیازمند هوشیاری کامل است احتیاط نمایید. از توشیدن الکل و سایر نوشیدنی‌ها و داروهای اسپری دار و سایر داروهای اسپری سپریس کنند مخفظ و اعصاب اجتناب نمایید. در طول مدت مصرف این دارو، آب گریب قرور نوشید. در صورت فراموشی یک دوز دارو، از دو بار گردن دوز بعدی خودداری نمایید. به دلیل ایجاد افزایش حساسیت به نور خوشید، در طول مصرف دارو بدون ضد آفتاب در معرض نور خوشید قرار نگیرید.

مقدار و نحوه مصرف:

میزان مصرف این دارو را پژوهش معالج تعیین می‌نمایید. در صورت امکان، دوز مصرفی روزانه در ۳ یا ۴ دوز منقسماً استفاده گردد. دارو را همراه با غذا مصرف نمایید.