

Cetadex®

Dextromethorphan / Guaifenesin / Phenylephrine

ستادکسی®

دکسترومتورفان / گایافنیزین / فنیل افرین

ترکیبات:

هر ۵ میلی لیتر حاوی:

گایافنیزین..... ۱۰۰ میلی گرم
دکسترومتورفان هیدروبروماید..... ۱۰ میلی گرم
فنیل افرین..... ۵ میلی گرم

شکل دارویی: محلول خوراکی

دسته دارویی: ضد سرفه، خلط آور، ضد احتقان

آثار درمانی: برطرف کننده سرفه و خلط

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید:

- ۱) در صورت سابقه حساسیت به این دارو (دکسترومتورفان، گایافنیزین و فنیل افرین)
- ۲) در صورت مصرف هر گونه داروی دیگر (احتمال مسمومیت دارویی به دلیل تشابه دارو وجود دارد)
- ۳) در صورت مصرف داروهای زیر طی دو هفته اخیر حتماً به پزشک خود اطلاع دهید: ایزوکربوکسازید، لینزولید، فنلزین، راسازولین، سلزلین و ترانیل سیپرومین
- ۴) در صورت مصرف وارفارین، دیکلوفنیک، بتا بلوکرها، مهارکننده های COMT مثل تولکابون، فزورلیدون، ایندومتاسین، ضداسفردگیهای سه حلقه ای، ایزونیاژید، سدیم اکسی بات (GHB)، بروموکریپتین، هیدانتوین، گوانادریل، گوانتیدین، مکامیل آمین، زرزپین و متیل دوپا، آرام بخش ها و داروهای کاهنده وزن
- ۵) در صورت سابقه مشکلات معده یا روده و سابقه صرع یا تشنج
- ۶) در صورت سابقه ابتلا به بیماریهای کلیوی، کبدی، قلبی-عروقی، حمله قلبی و بیماری عروق کرونری
- ۷) در صورت ابتلا به دیابت، گلوکوم، پرکاری تیروئید، بزرگی پروستات و فتوکروموسیتوما (تومور غده آدرنال)
- ۸) در صورت مصرف پتاسیم یا مواد حاوی پتاسیم
- ۹) در صورت مصرف نوشیدنیهای الکلی و یا داروهای حاوی الکل و مصرف دخانیات
- ۱۰) در صورتیکه دچار مشکلات خواب هستید

موارد احتیاط و هشدارها:

- این دارو را برای سرفه های مزمن و سرفه های شدید بدون مشورت با پزشک یا دکتر داروساز مصرف نکنید.
- در صورت سابقه ابتلا به پرفشاری خون و بیماری های قلبی-عروقی بدون مشورت با پزشک این محصول را مصرف نکنید.
- احتمال ایجاد سنگ های کلیوی با مصرف گایافنیزین وجود دارد. در صورت سابقه تشکیل سنگ کلیه این دارو را با احتیاط مصرف کنید.
- در صورت سابقه آسم، COPD، سرفه همراه با خلط یا سرفه به دلیل مصرف سیگار، آمفیزم و برونشیت مزمن و یا طولانی شدن بیش از ۷ روز علائم، دارو را خودسرانه مصرف نکنید و حتماً با پزشک در این باره مشورت کنید.
- در صورت داشتن علائم دیگر مانند تب و بدن درد حتماً به پزشک خود اطلاع دهید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این محصول در دوران بارداری در دسته C از طبقه بندی FDA قرار دارد. اطلاعات کاملی از ترشح مواد موثره این محصول در شیر وجود ندارد. بنابراین تحت نظر پزشک و با در نظر گرفتن فواید درمانی و عوارض آن مصرف گردد.

عوارض جانبی:

هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود؛ اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت مشاهده پزشک خود را مطلع سازید.

قلبی-عروقی: آریتمی، تپش قلب، افزایش فشار خون، تاکی کاردی، برادی کاردی

عصبی: سردرد، احساس سبکی در سر، گیجی، خواب آلودگی، لرزش، بی خوابی، بی قراری، عصبی شدن، علائم سایکوز، ضعف،

گوارشی: تهوع، ناراحتی گوارشی

حساسیتی: واکنش های حساسیتی مانند راش جلدی، کهیر، آگرانولوسیتوز، ترومبوسیتوپنی، لکوپنی

سایر: تعریق، دیستونی صورت و دهان، بلفارواسپاسم، بازگشت ادرار

مقدار و نحوه مصرف:

شربت را با استفاده از پیمانه مخصوص اندازه گیری که در جعبه وجود دارد، میل نمایید.

این محصول را بیش از ۷ روز مصرف نکنید و در صورت ادامه علائم به پزشک مراجعه کنید.

- بزرگسالان و بالغین بالای ۱۲ سال: ۱۰ میلی لیتر حداکثر هر ۴ ساعت
- ۶ تا ۱۲ سال: ۵ میلی لیتر حداکثر هر ۴ ساعت
- کودکان زیر ۶ سال: فقط با تجویز پزشک مصرف شود

تداخلات دارویی:

- فنیل افرین موجود در این محصول با داروهای MAOI، متیل دوپا، آلکالوئید های روثفایا، ضد افسردگی های سه حلقه ای، گوانیتیدین، داروهای اسیدی کننده و قلبیایی کننده ادرار و سایر ضاحقان ها تداخل دارد.
- دکسترومتورفان موجود در این محصول با داروهای MAOI، کینیدین و سبوترامین تداخل دارد.
- گایافنیزین موجود در این محصول باعث تغییر نتایج برخی آزمایشات مانند افزایش کلیرانس کلیوی، کاهش سطح سرمی اوریک اسید، مثبت کاذب تست وائیل ماندلیک برای کتکول ها و تداخل با تست تشخیصی سندروم کارسینوئید می گردد. توصیه می شود از ۴۸ ساعت قبل از آزمایش جمع آوری ادرار مصرف این دارو قطع شود.

موارد منع مصرف:

- افرادی که در حال درمان با داروهای MAOI هستند یا به این داروها حساسیت دارند.
- افرادی که به هر یک از اجزاء این فرآورده حساسیت دارند.

شرایط نگهداری:

دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید. دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها شربت دکسترومتورفان/ گایافنیزین/ فنیل افرین را با نام تجاری ستادکس®، در یک بطری پت قهوه ای ۲۰۰ میلی لیتری یا ظرف شیشه ای ۱۲۰ میلی لیتری به همراه برگه راهنما درون یک جعبه عرضه می نماید.