

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار تعیین شده بلافاصله به پزشک یا بیمارستان مسمومین مراجعه کنید.
از مصرف این دارو همراه با سایر داروهای حاوی استامینوفن خودداری کنید.

عوارض جانبی:

این دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود:

- در موارد بسیار نادر استامینوفن باعث واکنش های حساسیتی پوستی میشود.

- نارسایی کبدی، راش پوستی، تهوع، استفراغ، تشنج، تاول زدگی و خونریزی پوستی، خستگی نا متداول، فشار خون بالا، از دست دادن اشتها، تیره شدن ادرار، خارش، مدفوع رنگی، یرقان، سر درد، تغییر بینایی، شنیدن صدای زنگ در گوش ها، اضطراب و نگرانی، تنگی نفس، سردرد خفیف، سرگیجه و خواب آلودگی یا بی خوابی، خشکی دهان، بیینی و گلو، پیوست، احساس عصبی بودن و اضطراب.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو برای بیماران مختلف، متفاوت است. مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین میکند. بطور کلی طریقه مصرف پشخ زیرمیشاد:

شریت را با استفاده از پیمانه مخصوص اندازه گیری که در جعبه وجود دارد، میل نمایید. هر پیمانه معادل ۱۵ میلی لیتر می باشد.

- بزرگسالان و بالغین بالای ۱۲ سال: ۲۰۰ میلی لیتر هر ۴ تا ۶ ساعت

- ۶ تا ۱۲ سال: ۱۰۰ میلی لیتر هر ۴ تا ۶ ساعت

- زیر ۶ سال: فقط با تجویز پزشک مصرف شود

✳ توجه: دارو را حداکثر ۵ بار در هر ۲۴ ساعت مصرف ننماید.

✳ پیمانه را پر نکنید و دارو را مطابق دستور پزشک مصرف ننماید.

مسمومیت دارو:

امکان مسمومیت با این دارو کم است، در موارد نادر، فورا بیمار را به بیمارستان منتقل کنید.

شرایط نگهداری دارو:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد در ظروف در بسته و محکم نگهداری کنید.
دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها ترکیب استامینوفن، فنیل افرین و دیفن هیدرامین را با نام تجاری ستادین[®] دی به شکل شربت در ظروف پت ۲۰۰ میلی لیتری درون جعبه به همراه بروشور عرضه می نماید.

Cetadin[®]-D

ستادین[®] دی

شکل دارویی: شربت

ترکیبات در ۵ سی سی: استامینوفن ۱۶۰ میلی گرم، دیفن هیدرامین هیدروکلرید ۱۲/۵ میلی گرم و فنیل افرین هیدروکلرید ۲/۵ میلی گرم

دسته درمانی: ضد درد و تب، ضد سرفه، ضد احتقان بینی

اثر درمانی:



راهنمایهای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید:

۱-در صورت سابقه حساسیت به این دارو (استامینوفن، فنیل افرین و دیفن هیدرامین)

۲-در صورت مصرف هر گونه داروی دیگر (احتمال مسمومیت دارویی به دلیل تشابه دارو وجود دارد)

۳-در صورت مصرف داروهای زیر تا دو هفته اخیر حتماً به پزشک خود اطلاع دهید: ایزوکربوکسازید، لینزولید، فنلژین، رازاژیلین، سلژیلین و ترانیل سیپرومین

۴-در صورت سابقه آسم، COPD، سرفه همراه خلط یا سرفه به دلیل سیگار، آمفیزم و برونشیت مزمن

۵-در صورت سابقه مشکلات معده یا روده

۶-در صورت سابقه ابتلا به بیماریهای کلیوی، کبدی و قلبی-عروقی، حمله قلبی و بیماری عروق کرونری

۷-در صورت ابتلا به دیابت، گلوکوم، پرکاری تیروئید، بزرگی پروستات و فتوکروموسیتوم (تومور غده آدرنال)

۸-در صورت مصرف پتاسیم یا مواد حاوی پتاسیم

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

بهتر است این دارو در دوران بارداری مصرف نشود و یا با تجویز و صلاحدید پزشک مصرف گردد. به دلیل عدم وجود مطالعات در مورد ایمنی مصرف این دارو در خانم های شیرده، توصیه می شود در دوره مصرف دارو شیردهی انجام نشود.

هشدارها:

جهت ادامه درمان و تغییر دوز دارو حتما به پزشک خود مراجعه کنید.

دارو را بیشتر یا کمتر از مقدار تجویز شده توسط پزشک مصرف ننماید و از قطع خودسرانه مصرف دارو خودداری کنید.

به منظور بررسی پیشرفت درمان به طور منظم به پزشک مراجعه کنید.

مصرف بی رویه و خودسرانه استامینوفن باعث آسیب به کبد میشود.

در کودکان زیر ۶ سال با مشورت پزشک مصرف شود.

این دارو را بیشتر از ۷ روز مصرف ننمایید.