

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار تعیین شده بلافاصله به پزشک یا بیمارستان مسمومین مراجعه کنید.
از مصرف این دارو همراه با سایر داروهای حاوی استامینوفن خودداری کنید.
این دارو در افراد زیر ۶ سال با نظر پزشک مصرف شود.
این دارو را بیشتر از ۷ روز مصرف ننمایید.
در صورتی که تا دو روز بعد از مصرف این دارو هنوز احساس گلو درد به همراه تب، سردرد، راش، تهوع و استفراغ داشتید، سریعاً با پزشک خود مشورت نمایید.

عوارض جانبی:

این دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود:
واکنش های افزایش حساسیتی مثل راش پوستی، خارش، ادم لب، صورت و زبان. مشکلات تنفسی، تغییر بینایی، سردی پوست، احساس سبکی سر، نبض تند یا نامنظم، توم، فشار خون بالا، تشنج، لرزش، مشکلات ادراری، احساس خستگی، استفراغ.
همه عوارض احتیاج به توجهات پزشکی ندارند، در صورت شدت علائم به پزشک خود اطلاع دهید.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو برای بیماران مختلف، متفاوت است. مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین میکند.
شربت را با استفاده از پیمانه مخصوص اندازه گیری که در جعبه وجود دارد، میل نمایید. هر پیمانه معادل ۱۵ میلی لیتر میباشد.

- **بزرگسالان و بالغین بالای ۱۲ سال:** ۲۰ میلی لیتر هر ۴ تا ۶ ساعت
- **۶ تا ۱۲ سال:** ۱۰ میلی لیتر هر ۴ تا ۶ ساعت
- **۲ تا ۶ سال:** فقط با تجویز پزشک مصرف شود.

دارو را حداکثر ۵ بار در هر ۲۴ ساعت مصرف ننمایید.

پیمانه را پر نکنید و دارو را مطابق دستور پزشک مصرف نمایید.

مسمومیت دارو:

امکان مسمومیت با این دارو کم است، در موارد نادر، فوراً بیمار را به بیمارستان منتقل کنید.

شرایط نگهداری:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، در ظروف درب بسته و محکم نگهداری کنید.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها ترکیب استامینوفن، کلرفنیرامین، دکسترومتورفان و فنیل افرین را با نام تجاری ستادین-دی سی® به شکل شربت در ظروف پت ۲۰۰ میلی لیتری، درون جعبه به همراه برگه راهنما عرضه می نماید.

Cetadin-DC®

ستادین-دی سی®

شکل دارویی: شربت

ترکیبات در ۵ سی سی: استامینوفن ۱۶۰ میلی گرم، کلرفنیرامین مالئات ۱ میلی گرم، دکسترومتورفان هیدروبرومید ۵ میلی گرم و فنیل افرین هیدروکلرید ۲/۵ میلی گرم

دسته درمانی: ضد درد و تب، ضد سرفه، ضد احتقان بینی



برطرف کننده علائم سرماخوردگی، سردرد، بدن درد، آبریزش و گرفتگی بینی، تب، عطسه



سرفه احتقان سینوسها و آنفلوآنزا

راهنماییهای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید:

- در صورت سابقه حساسیت به این دارو (استامینوفن، کلرفنیرامین، دکسترومتورفان و فنیل افرین)
- در صورت مصرف هر گونه داروی دیگر (احتمال مسمومیت دارویی به دلیل تشابه دارو وجود دارد)
- در صورت مصرف داروهای زیر طی دو هفته اخیر حتماً به پزشک خود اطلاع دهید: ایزوکربوکسازید، لینزولید، فنلژین، رازاژیلین، سلزلیلین و ترانیل سیپرومین، وارفارین، آرام بخش و داروهای کاهنده وزن
- در صورت سابقه آسم، COPD، سرفه همراه خلط یا سرفه به دلیل سیگار، آمفیزم و برونشیت مزمن
- در صورت سابقه مشکلات معده یا روده
- در صورت سابقه ابتلا به بیماریهای کلیوی، کبدی و قلبی - عروقی، حمله قلبی و بیماری عروق کرونری
- در صورت ابتلا به دیابت، گلوکوم، پرکاری تیروئید، بزرگی پروستات و فنوکروموسیتوم (تومور غده آدرنال)
- در صورت مصرف پتاسیم یا مواد حاوی پتاسیم

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

بهتر است این دارو در دوران بارداری مصرف نشود و یا با تجویز و صلاحدید پزشک مصرف گردد. به دلیل عدم وجود مطالعات در مورد ایمنی مصرف این دارو در خانم های شیرده، توصیه می شود در دوره مصرف دارو شیردهی انجام نشود.

هشدارها:

- جهت ادامه درمان و تغییر دوز دارو حتماً به پزشک خود مراجعه کنید.
- دارو را بیشتر یا کمتر از مقدار تجویز شده توسط پزشک مصرف ننمایید و از قطع خودسرانه مصرف دارو خودداری کنید.
- به منظور بررسی پیشرفت درمان به طور منظم به پزشک مراجعه کنید.
- مصرف این دارو باعث خواب آلودگی میشود، از رانندگی و کارهایی که احتیاج به دقت و توجه دارند اجتناب شود.
- از نوشیدن الکل و داروهای حاوی الکل اجتناب شود.
- مصرف بی رویه و خودسرانه استامینوفن باعث آسیب به کبد میشود.
- در موارد بسیار نادر استامینوفن باعث واکنش های حساسیتی پوستی میشود.