

ستادین - جی[®] Cetadin-G[®]

شکل دارویی: شربت

ترکیبات در ۵ سی سی: استامینوفن ۱۲۵ میلی گرم، گایافنزین ۵۰ میلی گرم و فنیل افرین هیدروکلرید ۲/۵ میلی گرم

دسته درمانی: ضد درد و تب، ضد سرفه، خلط آور و ضد احتقان بینی



برطرف کننده علائم سرماخوردگی، سر درد، سرفه و خلط و گرفتگی بینی، تب، عطسه

احتقان سینوسها و آنفلوآنزا، کاهنده ترشحات ریوی

راهنمایهای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید:

- ۱- در صورت سابقه حساسیت به این دارو (استامینوفن، گایافنزین و فنیل افرین)
- ۲- در صورت مصرف هر گونه داروی دیگر (احتمال مسمومیت دارویی به دلیل تشابه دارو وجود دارد)
- ۳- در صورت مصرف داروهای زیر طی دو هفته اخیر حتماً به پزشک خود اطلاع دهید: ایزوکربوکسازید، لینزولید، فنلژین، رازاژیلین، سلژیلین و ترانیل سپرومین
- ۴- در صورت مصرف وارفارین، دیگوکسین، بتا بلوکرها، مهارکننده های COMT مثل تولکاپون، فورازولیدون، ایندومتاسین، ضدافسردگیهای سه حلقه ای، ایزونیاژید، سدیم اکسی بات (GHB)، بروموکریپتین، هیدانتوئین، گوانادول، گوانتیدین، مکامیل آمین، رزربین و متیل دوبا، آرام بخش ها و داروهای کاهنده وزن
- ۵- در صورت سابقه آسم، COPD، سرفه همراه خلط یا سرفه به دلیل مصرف سیگار، آمفیزم و برونشیت مزمن
- ۶- در صورت سابقه مشکلات معده یا روده و سابقه صرع یا تشنج
- ۷- در صورت سابقه ابتلا به بیماریهای کلیوی، کبدی و قلبی-عروقی، حمله قلبی و بیماری عروق کرونری
- ۸- در صورت ابتلا به دیابت یا گلوکوم، پرکاری تیروئید، بزرگی پروستات و فئوکروموسیتوما (تومور غده آدرنال)
- ۹- در صورت مصرف پتاسیم یا مواد حاوی پتاسیم
- ۱۰- در صورت مصرف نوشیدنیهای الکلی و یا داروهای حاوی الکل و مصرف دخانیات
- ۱۱- در صورتیکه دچار مشکلات خواب هستید.
- ۱۲- در صورت داشتن تب در سه روز گذشته حتماً به پزشک خود اطلاع دهید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

بهتر است این دارو در دوران بارداری مصرف نشود و یا با تجویز و صلاحیت پزشک مصرف گردد. به دلیل عدم وجود مطالعات کافی در مورد ایمنی مصرف این دارو در خانم های شیرده، توصیه می شود در دوره مصرف دارو شیردهی انجام نشود.

هشدارها:

جهت ادامه درمان و تغییر دوز دارو حتماً به پزشک خود مراجعه کنید.
دارو را بیشتر یا کمتر از مقدار تجویز شده توسط پزشک مصرف ننمایید و از قطع خودسرانه مصرف دارو خودداری کنید.

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار تعیین شده بلافاصله به پزشک یا بیمارستان مسمومین مراجعه کنید.
از مصرف این دارو همراه با سایر داروهای حاوی استامینوفن خودداری کنید.
مصرف بی رویه و خودسرانه استامینوفن باعث آسیب به کبد میشود.
این دارو در افراد زیر ۳ سال فقط با تجویز پزشک مصرف شود.
این دارو را بیشتر از ۷ روز مصرف ننمایید.
از این دارو برای سرفه های مزمن و سرفه های شدید بدون مشورت با پزشک یا دکتر داروساز مصرف نکنید.

عوارض جانبی:

این دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود:

- در موارد بسیار نادر استامینوفن باعث واکنش های حساسیتی پوستی میشود.
- نارسایی کبدی، راش پوستی، تهوع، استفراغ، تشنج، تاول زده گی و خونریزی پوستی، خستگی نا متداول، فشار خون بالا، از دست دادن اشتها، تیره شدن ادرار، خارش، مدفوع رنگی، یرقان، سر درد، تغییر بینایی، شنیدن صدای زنگ در گوش ها، اضطراب و نگرانی، تنگی نفس، سرگیجه و خواب آلودگی یا بی خوابی، خشکی دهان، بینی و گلو، یبوست، احساس عصبی و متوش بودن.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو برای بیماران مختلف، متفاوت است. مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین میکند. بطور کلی طریقه مصرف به شرح زیر می باشد:
شربت را با استفاده از پیمانه مخصوص اندازه گیری که در جعبه وجود دارد، میل نمایید. هر پیمانه معادل ۱۵ میلی لیتر میباشد.

بزرگسالان و بالغین بالای ۱۲ سال: ۲۰ میلی لیتر هر ۴ تا ۶ ساعت.

۶ تا ۱۲ سال: ۱۰ میلی لیتر هر ۴ تا ۶ ساعت

۳ تا ۶ سال: ۵ میلی لیتر هر ۴ تا ۶ ساعت

زیر ۳ سال: فقط با تجویز پزشک مصرف شود

☼ توجه: دارو را حداکثر ۵ بار در هر ۲۴ ساعت مصرف ننمایید.

☼ پیمانه را پر نکنید و دارو را مطابق دستور پزشک مصرف ننمایید.

مسمومیت دارو:

امکان مسمومیت با این دارو کم است، در موارد نادر، فورا بیمار را به بیمارستان منتقل کنید.

شرایط نگهداری دارو:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد در ظروف در بسته و محکم نگهداری کنید. دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها ترکیب استامینوفن، گایافنزین و فنیل افرین را با نام تجاری ستادین جی[®] به شکل شربت در ظروف پت ۳۰۰ میلی لیتری درون جعبه به همراه بروشور عرضه می نماید.