

کلوبتازول Clobetasol

شکل دارویی: کرم موضعی ۰/۰۵ درصد

دسته درمانی: کورتیکواستروئید موضعی، ضدالتهاب

اثر درمانی: درمان التهاب در درمان‌های حساس به کورتیکواستروئیدها، درمان موضعی کوتاه مدت پسوریازیس پلاک دار خفیف تا متوسط، التهاب و خارش متوسط تا شدید در درمان‌وز پاسخ دهنده به کورتیکواستروئید، آگزما، درماتیت، لیکن پلان، پمفیگوس، پمفیگولید

راهنمایهای عمومی: قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید:

۱- در صورت سابقه حساسیت به این دارو

۲- در صورت مصرف هر گونه داروی دیگر

۳- اگر دچار عفونت پوستی هستید یا ناحیه ای از پوست شما نازک شده و آتروفی گردیده است و در صورت ابتلا به rosacea و perioral dermatitis

۴- در صورتی که اخیراً به سرخک، سرخچه، توبرکلوز، ابله مرغان و زونا مبتلا شده اید و یا واکسن علیه این بیماریها دریافت کرده اید.

۵- در صورت مبتلا بودن به مشکلات گردش خون موضعی و سیستمیک

۶- در صورت عدم بهبود علائم و یا بدتر شدن

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

کلوبتازول در گروه C از طبقه بندی FDA قرار داشته و احتمالاً اثرات تراتوژن دارد و بهتر است مصرف نشده و یا با صلاحدید پزشک متخصص مصرف شود.

مصرف موضعی این کرم در دوران بارداری و یا شیردهی مخصوص به مدت طولانی و یا در نواحی وسیع و یا مقادیر زیاد و یا در اطراف پستان بخصوص

قبل از شیردهی توصیه نمی شود.

هشدارها:

❖ در سنین زیر ۱۲ سال استفاده نشده و یا با نظر پزشک مصرف گردد.

❖ این دارو را زیر نظر پزشک و دقیقاً مطابق دستورالعمل، مصرف نمایید.

❖ جذب سیستمیک کورتیکواستروئیدهای موضعی موجب مهار برگشت پذیر محور هیپوتالاموس-هیپوفیز- آدرنال شده، لذا در مصرف درازمدت و یا مقادیر زیاد علائم سندرم کوشینگ، هیپرگلیسمی و گلوکوزوری در برخی بیماران دیده می شود.

❖ در اطفال، سالمندان، آتروفی پوست، کاتاراکت، گلوکوم، دیابت شیرین، هریس و سل با احتیاط مصرف شود.

❖ برای راث پای بچه که در اثر پوشک ایجاد می شود از این محصول استفاده نگردد.

❖ در صورت عفونت محل مصرف، دارو را با احتیاط مصرف کنید.

❖ استفاده از این دارو در ناحیه صورت توصیه نمی گردد. در حالی که بر روی صورت استفاده شود، درمان نباید بیش از ۵ روز به طول بینجامد.

عوارض جانبی:

هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. گر چه همه این عوارض اتفاق نمی افتد ولی در صورت بروز ممکن است نیاز به توجه پزشکی داشته باشند.

واکنش های درماتیت تماسی (سوزش، خارش)، بی حسی در انگشتان دست و پا، افزایش تحریک پذیری پوست، آتروفی پوست، پورپورا، تاول، فولیکولیت، پوستول، وزیکول، عفونتهای ثانویه پوست و تلائزکناری، واکنش های حساسیتی و راش، سرکوب محور HPA، نازکی پوست، خشکی پوست، قرمزی، کهیر،

آکنه، احساس درد و سوزش در موضع، دوبینی.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

❖ پیش از شروع به مصرف دارو، بروشور داخل جعبه را به دقت مطالعه فرمایید.

❖ مقدار مصرف دارو برای بیماران مختلف، متفاوت است.

❖ دارو را دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف نمایید.

❖ برای اینکه مصرف دارو فراموش نشود سعی کنید دارو را در ساعت های مشخص مصرف کنید.

مسمومیت دارویی:

در صورت مسمومیت فوراً بیمار را به بیمارستان منتقل کنید. علائم مسمومیت عبارتند از: توم دیداری و شنیداری، عدم هوشیاری، تهوع، تشنج، تاکی کاردی و استفراغ.

شرایط نگهداری دارو:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها کلوبتازول ۰/۰۵ درصد را به صورت کرم در تیوبهای ۱۵ گرمی در جعبه عرضه می نماید.