

مقدار و نحوه مصرف دارو:

- مقدار مصرف دارو برای بیماران مختلف، متفاوت است. مقدار مصرف دارو توسط پزشک تعیین می گردد.
- واژن را شسته، تمیز و خشک نمایید. دستان خود را شسته، اپلیکاتور را از روکش پلاستیکی جدا کرده و از کرم پر نمایید؛ طبق دستور پزشک ترجیحا در شب قبل از خواب، یک اپلیکاتور را از کرم پر نموده، به پشت دراز کشیده و اپلیکاتور را آرام و کامل به داخل واژن فشار دهید. سپس دسته داخل اپلیکاتور را فشار داده تا کرم کاملا از لوله اپلیکاتور خارج شود؛ بعد از مصرف تا ۱۵ دقیقه از ایستادن اجتناب کنید.

مسمومیت دارویی:

در صورت مصرف خوراکی این کرم به اشتباه، فوراً بیمار را به بیمارستان منتقل کنید.

طریقه مصرف کرم واژینال

(۲) به آرامی تیوب دارو را فشار دهید تا کرم به داخل اپلیکاتور وارد شود و میله اپلیکاتور به انتهای آن برسد. اپلیکاتور را از تیوب جدا نموده و درپوش تیوب را ببندید.

(۱) درپوش تیوب دارو را بردارید و اپلیکاتور را روی آن قرار دهید.



شرایط نگهداری دارو:


دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد در ظروف در بسته و محکم نگهداری کنید. دارو را از یخ زدگی محافظت کنید. دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها کرم کلوتریمازول واژینال ۱٪ و ۲٪ را در تیوب و درون جعبه به همراه اپلیکاتور عرضه می نماید.
هر ۱۰۰ گرم کرم واژینال ۱٪ حاوی ۱ گرم کلوتریمازول و هر ۱۰۰ گرم کرم واژینال ۲٪ حاوی ۲ گرم کلوتریمازول می باشد.



(۳) به پشت بخوابید و (ازنواحی خود را خم کنید.



(۵) به آرامی میله اپلیکاتور را فشار دهید تا کرم کاملاً تخلیه گردد. اپلیکاتور را بیرون بیاورید و دور بیندازید.

(۴) اپلیکاتور را تا جاییکه میتوانید به داخل رحم فرو کنید.



Clotrimazole

کلوتریمازول

شکل دارویی: کرم واژینال ۱ درصد و ۲ درصد

دسته درمانی: ضد قارچ

اثر درمانی: درمان عفونت های قارچی واژینال

راهنمایهای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید. قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید.

- در صورت سابقه حساسیت به این دارو
- در صورت مصرف هرگونه داروی دیگر
- در صورت بارداری و شیردهی
- در صورت مصرف داروهای ضدقارچ دیگر، از جمله مایکونازول، تیوکونازول، فلوکونازول و ایتراکونازول
- در صورت سابقه بیماری جنسی و آمیزشی خود یا همسران
- افراد با سن کمتر از ۱۶ سال و یا بالاتر از ۶۰ سال

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

در دوران بارداری (به خصوص سه ماهه اول بارداری) و شیردهی با تجویز پزشک مصرف گردد.

هشدارها:

- جهت ادامه درمان و تغییر دوز دارو حتماً به پزشک خود مراجعه کنید. دارو را بیشتر یا کمتر از مقدار تجویز شده توسط پزشک مصرف ننمائید و از قطع خودسرانه مصرف دارو خودداری کنید. به منظور بررسی پیشرفت درمان به طور منظم به پزشک مراجعه کنید.
- در صورت حساسیت یا تحریک موضع و خارش و یا عدم بهبود، مصرف دارو را قطع کرده و به پزشک خود اطلاع دهید.
- کلوتریمازول باعث کاهش اثر کاندوم و دیافراگم در جلوگیری از بارداری میگردد؛ لذا در طول دوره درمان از روش دیگری جهت پیشگیری از بارداری استفاده ننمایید.
- در طول درمان، از مصرف تامپون، دوش واژینال، اسپرم کش و یا هرگونه داروی داخل واژنی دیگر خودداری نمایید.
- اگر علائم شما بهبود یافت ولی بیماری پس از مدتی بازگشت، برای دومین دوره درمانی از کلوتریمازول استفاده ننمایید، ولی از مصرف بیش از دو دوره درمانی در طول شش ماه بدون مشورت با پزشک خودداری نمایید.
- برای پیشگیری و درمان عفونت، از پوشیدن لباس زیر تنگ و نایلونی و مواد معطر از جمله صابون و ژل شستشوی معطر خودداری کنید.

عوارض جانبی:

- این دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، گرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد ولی در صورت بروز ممکن است نیاز به توجه پزشکی داشته باشد.
- عوارضی که بندرت مشاهده می شوند: خارش، سوزش، اریتما، کهیر و ادم
- در صورت بروز هرگونه علائم دیگر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.