



شرکت داروسازی رها
RAHA Pharmaceutical Co.

عوارض جانبی:

به صورت نادر موارد زیر گزارش شده است: سرگیجه، سردرد، بی خوابی، بی اشتها و کاهش نبض.

مسمومیت دارویی:

از نظر تئوری در مصرف بیش از اندازه دارو تحریک پذیری سیستم عصبی قابل پیش بینی است. آنتی دوت مشخصی شناخته نشده است.

شرایط نگهداری دارو:

دارو را دور از نور و رطوبت در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها میورین را با نام تجاری کولومب® به صورت قرص ۱۳۵ میلی گرمی و کپسول پیوسته رهش ۲۰۰ میلی گرمی، در پلیستر و درون جعبه، عرضه مینماید.

TAB.LFT.CLM.135/040_03

اصفهان - کیلوستر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه، واحد ۱۱، صندوق پستی: ۵۶۷-۸۱۷۴۵ تلفن: ۳۶۵۴۰۶۵۹-۳۱ (۰۹۸)
www.rahapharm.com فکس: ۳۶۵۴۰۹۵۹-۳۱ (۰۹۸)

2



شرکت داروسازی رها
RAHA Pharmaceutical Co.

Colomeb® Mebeverine

کولومب® میورین

شکل دارویی: قرص ۱۳۵ میلی گرم و کپسول پیوسته رهش ۲۰۰ میلی گرم

دسته دارویی: آنتی کولینرژیک - داروهای گوارشی

موارد مصرف و آثار درمانی:

ضد اسپاسم، درمان علامتی درد و گرفتگی عضلات شکمی، سندرم روده تحریک پذیر یا IBS، درمان کمکی در اختلالات گوارشی.

راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید:

• در صورت حساسیت به این دارو یا هریک از اجزای تشکیل دهنده دارو یا سابقه حساسیت به داروهای دیگر.

• در صورت ابتلا به نارسایی کبدی، نارسایی کلیوی، اختلالات قلبی، آنژین قلبی، پورفیریا، سیستیک فیبروز و عدم تحمل لاکتوز.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

اطلاعاتی در رابطه با میورین هیدروکلراید در دوران بارداری وجود ندارد. بهتر است پزشک معالج با توجه به منافع و مضرات، دارو را تجویز نماید. این دارو به مقدار کم در شیر ترشح میشود.

هشدارها:

• در صورت ابتلا به انسداد روده یا فلج روده (Paralytic ileus) از مصرف این دارو خودداری کنید.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار و دوز مصرف را پزشک تعیین میکند.

مقدار مصرف معمول دارو در بزرگسالان:

یک قرص ۱۳۵ میلی گرمی کولومب® ۳ بار در روز قبل از غذا.

۱ کپسول ۲۰۰ میلی گرمی کولومب® ۳ بار در روز قبل از غذا.

مقدار مصرف معمول دارو در کودکان بر طبق BNFC سه بار در روز، ۲۰ دقیقه قبل از غذا و به صورت زیر میباشد.

۳ تا ۴ سال: ۲۵ میلی گرم

۴ تا ۸ سال: ۵۰ میلی گرم

۸ تا ۱۰ سال: ۱۰۰ میلی گرم

۱۰ تا ۱۸ سال: همانند بزرگسالان

اصفهان - کیلوستر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه، واحد ۱۱، صندوق پستی: ۵۶۷-۸۱۷۴۵ تلفن: ۳۶۵۴۰۶۵۹-۳۱ (۰۹۸)
www.rahapharm.com فکس: ۳۶۵۴۰۹۵۹-۳۱ (۰۹۸)

1