

Decofzol® 0.05% Naphazoline HCl

دکوفزول® ۰۰۵/۰ درصد

نفازولین هیدروکلراید

شکل دارویی: اسپری بینی ۱۵ میلی لیتری

ترکیبات: هر ۱۰۰ میلی لیتر حاوی ۰۰۵/۰ گرم نفازولین هیدروکلراید

دسته درمانی: سمپاتومیمتیک، ضد احتقان، منقبض کننده عروقی

موارد مصرف: احتقان بینی، سرما خوردگی، احتقان شیپور استاش، تب یونجه (Hay Fever)، سینوزیت

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید. قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت نمایید:

در صورت سابقه حساسیت به این دارو

در صورت مصرف هر نوع داروی دیگر اعم از داروهای گیاهی، شیمیایی یا ویتامین و مکمل ها، به ویژه داروهای مهار کننده مونو آمین اکسیداز (ترانیل سیپرومین، فنلژن، ایزوگربوکسازید، سالتیلین)، داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای (آمی تریپتیلین، کلومیپرامین، دوکسپین، نورتپتیلین)، ماپروتیلین، فلوکستین، دولوکستین و سرتالین (به علت بروز بحران افزایش فشار خون). در صورت داشتن انحراف بینی، گرفتگی یا شکستگی بینی و سابقه جراحی بینی.

در صورت ابتلا به بیماری های عروقی، فشار خون بالا، کم کاری تیروئید، دیابت و هیپرگلیسمی، عفونت، سابقه جراحی کلونوم و پروستات

هشدار ها:

اسپری بینی دکوفزول حاوی بنزاکونیتوم کلراید به عنوان نگهدارنده می باشد.

این دارو بی رنگ، شفاف و بدون بو می باشد. در صورت کدورت یا تغییر رنگ محلول از مصرف آن خودداری نمایید.

این دارو را به مدت حداکثر ۳ روز مصرف نمایید زیرا مصرف مکرر و طولانی مدت آن می تواند منجر به احتقان برگشتی گردد.

جهت ادامه درمان و تغییر دوز دارو حتما به پزشک خود مراجعه کنید.

دارو را بیشتر یا کمتر از مقدار تجویز شده توسط پزشک مصرف ننمایید و از قطع خود سرانه مصرف دارو خودداری نمایید.

یک ماه پس از باز شدن دربوش ظرف، باقیمانده ی دارو را دور بریزید.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو بر اساس شرایط بیمار توسط پزشک تعیین می گردد. مقدار مصرف معمول دارو به شرح زیر می باشد:

بزرگسالان و افراد بالای ۱۲ سال: یک تا دو پاف در هر سوراخ بینی هر ۳-۴ ساعت (حداکثر تا ۷۲ ساعت)

کودکان و خردسالان زیر ۱۲ سال: مصرف در این گروه سنی توصیه نمی شود.

قبل از هر بار مصرف قوطی اسپری را به خوبی تکان دهید (شکل ۱). طبق شکل ۲ اسپری را نگه داشته و ۵ بار آن را در هوا اسپری کنید تا قطرات مایع را در هوا ببینید.



(شکل ۵)

(شکل ۴)

(شکل ۳)

(شکل ۲)

(شکل ۱)

اسپری بینی به دلیل سیال بودن به سرعت به حلق منتقل می شود و بی اثر می گردد، بنابراین حتما باید به روش صحیح از آن استفاده کنید؛ ابتدا بینی را تمیز کنید و با قدرت، کل یازدم خود را از بینی خارج کنید. دست ها را بشوید، بنشینید و سر را کاملاً عقب خم کنید یا اینکه دراز بکشید و بالشی را در زیر شانه ها قرار دهید. نوک اسپری را در سوراخ بینی قرار دهید و با دست مقابل سوراخ دیگر بینی را فشار دهید (شکل ۳).

مقدار داروی لازم را در هر سوراخ بینی اسپری کنید. سپس فوراً سر را به سمت زانو خم کنید و چندین بار به آرامی سر را به چپ و راست تکان دهید، چند دقیقه به همین حالت باقی بمانید. نوک اسپری را با آب گرم و دستمال تمیز کنید (شکل ۴و ۵).

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این دارو در رده C از طبقه بندی FDA قرار دارد و در دوران بارداری باید با صلاحیت پزشک مصرف گردد. در صورت حاملگی یا قصد بارداری به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. به دلیل عدم وجود مطالعات کافی، بهتر است در دوران شیردهی استفاده نگردد.

عوارض جانبی:

هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته گردد. گرچه همه این عوارض در یک فرد رخ نمی دهد ولی در صورت بروز هر یک از این عوارض به پزشک اطلاع دهید: سردرد، سر گیجه، ضعف، سوزش بینی، تحریک مخاط، عطسه، تهوع و تغییر رفتار.

هشوییت دارویی:

احتمال مسمومیت با این دارو کم است، در صورت ایجاد مسمومیت بیمار را فوراً به بیمارستان منتقل کنید. علائم مسمومیت و مصرف بیش از حد عبارت است از: افت فشار خون، برادیکاردی، کاهش دمای بدن، دیرسپون عصبی و کما.

شرایط نگهداری:

دارو را دور از نور، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و در ظروف در بسته نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

دارو را دور از دید و دسترس اطفال نگهداری نمایید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها نفازولین ۰۰۵/۰ درصد را با نام تجاری دکوفزول® به شکل اسپری بینی در ظروف ۱۵ میلی لیتری و درون جعبه به همراه برگه راهنما عرضه می نماید.