



دکوفن® ۰.۲۵ درصد

فنیل افرین هیدروکلراید

ترکیبات: فنیل افرین هیدروکلراید ۰.۲۵ گرم در هر ۱۰۰ میلی لیتر

شکل دارویی: اسپری بینی

دسته درمانی: ضد احتقان

موارد مصرف:

برطرف کننده گرفتگی بینی در اثر سرماخوردگی، تب یونجه، سینوزیت و دیگر حساسیت های دستگاه تنفسی فوقانی، احتقان سینوس ها.

هشدارها:

- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:
- « در صورت مصرف هر گونه دارو از جمله داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز (مانند ترانایل سیپرومین، فنلژین و ایزوکربوکساناید)، داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای (مانند آمی تریپتیلین، نور تریپتیلین) و داروهای بتا بلاکر (مانند آتنولول و پروپرانولول).
- « در صورت سابقه بیماری های کبدی و کلیوی، بیماری های قلبی، تیروتوکسیکوز، فشارخون بالا و دیابت.
- دارو را طبق دستور پزشک مصرف نمایید و از مصرف بیش از مقدار تجویز شده توسط پزشک خودداری نمایید.
- مصرف بیش از مقدار تجویز شده و مکرر فنیل افرین ممکن است موجب عود مجدد احتقان بینی گردد. لذا از مصرف به مدت بیش از ۳ روز اسپری دکوفن جداً خودداری نمایید.
- در صورتیکه پس از ۳ روز درمان، علائم بیماری بهبود نیافته و یا توأم با تب باشد با پزشک خود مشورت نمایید.
- در افراد بالای ۶۰ سال و بیماران قلبی با احتیاط مصرف گردد.
- پس از پایان دوره درمان و احساس بهبودی، بهتر است اسپری را دور انداخته تا از مصرف مجدد آن در دوره بعدی خودداری گردد.
- در صورتیکه یک نوبت مصرف دارو را فراموش کرده اید به محض به یادآوردن آن را مصرف نمایید اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد از مصرف آن خودداری و مقدار مصرف بعدی را نیز دو برابر ننمایید.
- در صورت تغییر رنگ محلول، کدورت و یا وجود رسوب از مصرف دارو خودداری نمایید.
- پس از هر بار مصرف دپوش ظرف را محکم ببندید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این دارو در رده C از طبقه بندی FDA قرار دارد.

مصرف دارو در دوران بارداری و شیردهی حتماً باید با نظر پزشک باشد.



مقدار و نحوه مصرف:

- بزرگسالان (سنین بالای ۱۲ سال): ۲-۳ پاف در هر سوراخ بینی، هر ۴ ساعت در صورت نیاز (حداکثر به مدت ۳ روز).
- کودکان (۶-۱۲ سال): ۲-۳ پاف در هر سوراخ بینی، هر ۴ ساعت در صورت نیاز (حداکثر به مدت ۳ روز).
- هنگام مصرف، اسپری را عمودی گرفته، سر را مستقیم نگهداشته و همزمان با اسپری کردن نفس عمیق بکشید.
- هنگام مصرف سعی شود سر اسپری با بافت بینی تماس پیدا نکند زیرا ممکن است سبب انتشار عفونت گردد.

عوارض جانبی:

- هر دارویی به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز عوارض نا خواسته ای نیز شود. گر چه همه ی این عوارض در یک فرد رخ نمی دهد اما در صورت بروز هر کدام از این عوارض با پزشک خود مشورت نمایید:
- عوارض آلرژیک، تحریک موضعی، خشکی بینی، عطسه، احساس سوزش یا درد، ترشحات بینی، احتقان برگشتی.
- عوارض بسیار نادر: شامل بی نظمی و کندی ضربان قلب، فشارخون و بی نظمی تنفس.

موارد منع مصرف:

- سابقه حساسیت به فنیل افرین یا هر یک از اجزای فرمولاسیون
- مصرف همزمان با داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز

مسمومیت دارویی:

در صورت مصرف بیش از مقدار تجویز شده، بیمار را به بیمارستان منتقل نمایید.

شرایط نگهداری دارو:

- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها اسپری بینی فنیل افرین هیدروکلراید ۰.۲۵ درصد را با نام تجاری دکوفن® ۰.۲۵ درصد، داخل جعبه و به همراه برگه راهنما عرضه می نماید.