

Desloratadine 2.5 mg/ 5 ml

دس لوراتادین ۲/۵ میلی گرم در ۵ میلی لیتر

شکل دارویی: شربت

دسته دارویی: آنتی هیستامین (مهارکننده گیرنده H₁)

موارد مصرف و آثار درمانی:

بهبود علائم رینیت آلرژیک فصلی یا مزمن
درمان کهیر مزمن بدون علت؛ بهبود خارش و کاهش تعداد و اندازه ضایعات پوستی

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.
در صورتی که هر یک از شرایط زیر را دارید، پیش از مصرف پزشک خود را مطلع کنید:

- سابقه حساسیت به این دارو یا هر یک از اجزاء فرآورده
- نارسایی و اختلال در عملکرد کبد یا کلیه
- شیردهی

دارو را دقیقاً مطابق با دستور پزشک مصرف کنید و حتی یک دوز از دارو را بدون نظر پزشک قطع نکنید.

موارد احتیاط و هشدارها:

- این دارو در افرادی که سابقه تشنج دارند (به خصوص در کودکان) بایستی با احتیاط مصرف شود. زیرا احتمال تشنج مجدد افزایش می یابد.
- در کودکان کمتر از ۲ سال تشخیص رینیت آلرژیک مشکل می باشد و حتماً باید از عدم وجود عفونت در قسمت فوقانی دستگاه تنفسی و ناهنجاری های ساختاری اطمینان حاصل شود.
- این دارو در افراد مبتلا به نارسایی شدید کلیه باید با احتیاط مصرف شود.
- این دارو در افرادی که مبتلا به نارسایی کبد هستند بایستی با احتیاط مصرف شود و در صورت نیاز سطح آنزیم های کبدی پایش شود.
- در صورتی که این دارو در افرادی با توان متابولیسم پایین (مانند کودکان) استفاده شود، ممکن است عوارض به صورت وابسته به دوز افزایش یابد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این دارو در دسته C از طبقه بندی FDA قرار دارد بنابراین مصرف آن در بارداری بایستی با احتیاط صورت گیرد.
این دارو در شیر مادر ترشح می گردد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

بزرگسالان: ۱۰ میلی لیتر (۵ میلی گرم) یک بار در روز
کودکان:

بزرگتر از ۱۲ سال: ۱۰ میلی لیتر (۵ میلی گرم) یک بار در روز
۶ تا ۱۱ سال: ۵ میلی لیتر (۲/۵ میلی گرم) یک بار در روز
۱۲ ماه تا ۵ سال: ۲/۵ میلی لیتر (۱/۲۵ میلی گرم) یک بار در روز
ایمنی و اثر بخشی این دارو برای کودکان کمتر از ۱ سال ثابت نشده است.

هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود؛ اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت مشاهده پزشک یا داروساز خود را مطلع سازید.

عوارض شایع: سردرد، بی خوابی، خشکی دهان، اسهال، خستگی، تب.

عوارض نادر: افزایش اشتها، توهم، رفتار غیرطبیعی، گیجی، بی حالی، علائم سایکوموتور، تشنج، تاکی کاردی، تپش قلب، افزایش طول QT، درد شکمی، تهوع، استفراغ، سوء هاضمه، افزایش آنزیم های کبدی، افزایش بیلی روبین، زردی، حساسیت به نور، واکنش های حساسیتی (مانند راش جلدی، آنافیلاکسی، آنژیوادم، تنگی نفس، خارش و کهیر)، ضعف، دیس منوره، میالژی.

تداخلات دارویی:

در مطالعات بالینی تداخل خاصی برای این دارو گزارش نشده است. با این حال در هنگام مصرف همزمان با سایر داروها، یا پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

مسمومیت:

علائم خاصی از مسمومیت با این دارو تا دوز ۴۵ میلی گرم در روز مشاهده نشده است. این دارو توسط همدیالیز از گردش خون حذف نمی گردد. درمان مسمومیت بایستی به روش علامت درمانی و حمایتی صورتی گیرد.

موارد منع مصرف:

حساسیت به دارو یا هر یک از اجزاء آن

شرایط نگهداری دارو:

دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها شربت دس لوراتادین را در جعبه به همراه برگه راهنما و پیمانه بسته بندی و به بازار عرضه میکند.