



شرکت داروسازی رها  
RAHA Pharmaceutical Co.

## Diphenhydramine 50mg/ml Dihiston®

دیفن هیدرامین ۵۰ میلی گرم در میلی لیتر  
دی هیستون®

**اشکال دارویی:** آمپول ۵۰ میلی گرم در میلی لیتر  
**دسته دارویی:** آنتی هیستامین  
**آثار درمانی و موارد مصرف:**

- ❖ درمان علائمی بیماری مسافرت (Motion Sickness)، سرگیجه، تهوع و استفراغ.
- ❖ درمان کمکی در شوک آنافیلاکسی به همراه اپی نفرین
- ❖ جایگزین مناسب فرم خوراکی در زمانی که امکان بلع نبوده و یا منع مصرف خوراکی وجود داشته باشد.
- ❖ ضد پارکینسون به تنهایی یا ترکیب با مواد آنتی کولینرژیک دیگر.
- ❖ به عنوان آرامبخش، خواب آور، آنتی کولینرژیک و ضد حساسیت.
- ❖ کونژکتیویت، بیماری های پوستی خارش دار
- ❖ دیستونی القا شده در اثر مصرف آنتی سایکوتیک ها ( off-lable Use )

**راهنمایهای عمومی:**

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.  
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
- ۱- در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو، غذا، ماده رنگی یا ماده محافظ
  - ۲- در صورت مصرف داروهایی مانند: CNS دپرسانت ها، ضد افسردگی های سه حلقه ای، مهارکننده های مونو آمینو اکسیداز
  - ۳- در صورت ابتلا به آسم، گلوکوم با زاویه بسته، اختلال در ریتم قلب، بیماریهای کبدی، نارسایی کلیوی، بیماریهای مزمن ریوی، هایپرتروفی پروستات و اشکال در دفع ادرار

**مصرف در دوران بارداری و شیر دهی:**

( گروه B ) این دارو را در بارداری فقط با نظر پزشک مصرف کنید. مصرف این دارو در دوران شیر دهی منع مصرف دارد.

**هشدارها:**

- ۱- این دارو در پورفیریا، بیماری های سیستم تنفسی فوقانی (ازجمله آسم)، نوزادان نارس و سابقه واکنشهای حساسیتی (هایپرسنسیتیویتی) منع مصرف دارد.
- ۲- از آنجا که این دارو باعث گیجی و خواب آلودگی می شود، در حین مصرف از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری دارند خود داری کنید.
- ۳- احتمال بروز عوارض جانبی این دارو از قبیل بی قراری، عصبی شدن، تحریک پذیری در کودکان بیشتر از بزرگسالان است.
- ۴- از آنجا که دیفن هیدرامین تهوع و استفراغ را کنترل میکند ممکن است این دارو علائم مسمومیت با سایر داروها یا آپاندیسیت را بپوشاند. در صورت داشتن سایر علائم آپاندیسیت نظیر درد شکمی و غیره پزشک خود را از مصرف این دارو آگاه کنید.

**مقدار و نحوه مصرف:**

- این دارو به صورت تزریق عمیق عضلانی، تزریق آهسته وریدی و یا انفوزیون وریدی تجویز می گردد.  
جهت تزریق بصورت انفوزیون با هیچ یک از انواع سرم تداخل ندارد.  
❖ به دلیل تحریک و التهاب موضعی از تزریق زیر جلدی و داخل جلدی این دارو خودداری گردد.  
❖ در صورت تزریق وریدی، سرعت تزریق نباید از ۲۵ میلی گرم در دقیقه تجاوز کند.

1

اصفهان- کیلوتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه، واحد ۱۱، صندوق پستی: ۵۶۷-۱۱۷۴۵، تلفن: ۳۶۵۴۰۶۵۹-۳۱(۰۹۸)  
www.rahapharm.com  
فکس: ۳۶۵۴۰۶۵۹-۳۱(۰۹۸)

(P.1)



شرکت داروسازی رها  
RAHA Pharmaceutical Co.

**بزرگسالان:**

میزان مصرف دارو را پزشک معالج تعیین می کند.

❖ **ضد حساسیت:**

به صورت داخل وریدی یا داخل عضلانی ۱۰ تا ۵۰ میلی گرم

❖ **ضد تهوع و سر گیجه:**

۱۰ میلی گرم به صورت داخل وریدی یا داخل عضلانی جهت شروع درمان و در صورت نیاز ۲۰ تا ۵۰ میلی گرم هر ۲ تا ۳ ساعت.

❖ **حداکثر دوز مصرفی در بزرگسالان:** ۱۰۰ میلی گرم در هر دوز مصرفی و یا ۴۰۰ میلی گرم روزانه.

**عوارض جانبی:**

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته ای نیز بشود. اگر چه در اغلب بیماران عارضه چندانی بروز نکرده و یا عوارض جزئی با ادامه درمان و تطبیق بدن با دارو بر طرف می شود. لذا در صورت بروز بعضی از عوارض و ادامه یا تشدید آنها با پزشک مشورت کنید.

**عوارضی که نیاز به توجه پزشک دارند:**

❖ **عوارض نادر:**

ضعف غیر معمول، تب، خستگی

❖ **علائم مصرف بیش از حد:**

از دست دادن مهارت در انجام کارها یا بی ثباتی، تشنج، خونریزی غیر عادی، خشکی شدید دهان، بیثی و گلو، برافروختگی یا قرمز شدن پوست، یا اختلال در تنفس، تنگی نفس، توهم، خواب آلودگی، احساس ضعف.

❖ **عوارضی که در صورت تداوم یا ادامه یافتن نیاز به توجه پزشکی دارند:**

- **عوارض شایع:** خواب آلودگی، غلیظ شدن ترشحات تنفسی، سر درد، خشکی دهان

- **عوارض با شیوع کمتر:** تاری دید، اشکال در ادرار کردن، سرگیجه، عصبانیت، هیجان و بی قراری، درد معده، کابوس های شبانه، تحریک پذیری غیرعادی در کودکان و سالمندان.

**مسمومیت:**

فرد مسموم را سریعاً به بخش مسمومین بیمارستان منتقل کنید.

**شرایط نگهداری:**

- دارو را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید و از یخ زدگی محافظت نمایید.
- دارو را دور از نور مستقیم نگهداری کنید.
- دارو را دور از دسترس اطفال نگهدارید.

**بسته بندی:**

❖ شرکت داروسازی رها آمپول دیفن هیدرامین را با نام تجاری دی هیستون® در پوکه های ۱ میلی لیتری تیره و جعبه های مقوایی ۱۰ عددی به همراه برگه راهنما بسته بندی و به بازار عرضه می نماید.

❖ هرآمپول دی هیستون® حاوی ۵۰ میلی گرم در میلی لیتر دیفن هیدرامین هیدروکلراید می باشد.

2

اصفهان- کیلوتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه، واحد ۱۱، صندوق پستی: ۵۶۷-۱۱۷۴۵، تلفن: ۳۶۵۴۰۶۵۹-۳۱(۰۹۸)  
www.rahapharm.com  
فکس: ۳۶۵۴۰۶۵۹-۳۱(۰۹۸)

AMPLFT.DHT/012.07

(P.2)