



- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو، به محض به یاد آوردن فوراً آن را مصرف نمایید اما اگر زمان مصرف نوبت بعدی نزدیک است، نوبت فراموش شده را مصرف نکنید و از دوبرابر کردن مقدار مصرف خودداری نمائید.
- بدون دستور پزشک، مصرف دارو را قطع ننمائید.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می نماید، اما به طور معمول مقدار مصرف این دارو بدین صورت می باشد:
بزرگسالان: ۲ پاف در هر سوراخ بینی، یکبار در روز و یا ۱ پاف در هر سوراخ بینی هر ۱۲ ساعت یکبار
کودکان ۴ تا ۱۱ سال: ۱ پاف در هر سوراخ بینی، یکبار در روز

عوارض جانبی:

هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی، ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته ای نیز بشود، اگرچه همه ی این عوارض در یک فرد رخ نمی دهد اما در صورت بروز هرکدام از آنها سریعاً با پزشک خود مشورت نمایید:
 زخم مخاط بینی، احساس خشکی بینی، احساس بوی بد در بینی، درد عضلانی، سر درد، خس خس ریه، التهاب چشم، صورت و یا لب ها، وزوز گوش.

مسمومیت:

در صورت مسمومیت فوراً بیمار را به بیمارستان منتقل نمایید.

شرایط نگهداری :

دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
 دارو را دور از دید و دسترس اطفال نگهداری نمایید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها فلوتیکازون را با نام تجاری فلازون[®] به شکل اسپری بینی در ظروف پلی اتیلنی و درون جعبه عرضه می نماید.



Felazon[®]

Fluticasone propionate 50 mcg/dose

فلازون[®]

فلوتیکازون پروپیونات ۵۰ میکروگرم در هر دوز

ترکیبات: ۰/۵ گرم فلوتیکازون پروپیونات در هر ۱۰۰ میلی لیتر

شکل دارویی: اسپری بینی

دسته دارویی: ضد التهاب استرویدی

موارد مصرف: درمان رینیت آلرژیک

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- در صورت سابقه حساسیت به این دارو
- در صورت ابتلاء به بیماری های کبدی، دیابت، آسم، هیپوتیروئیدسم، جراحی بینی و یا ضربه بینی و هر گونه زخم جدید در بینی، سل فعال یا نهفته دستگاه تنفسی، سکنه قلبی اخیر، گلوکوم، عفونتهای قارچی، باکتریائی، ویروسی، هریس سیمپلکس چشمی
- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله ریفامپین، اقدرین، فنوباریتال

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

در دوران بارداری و شیردهی فقط با نظر پزشک متخصص مصرف گردد.

هشدارها:

• دارو را طبق دستور پزشک مصرف نمایید و از مصرف بیش از مقدار تجویز شده و یا بیش از مدت تعیین شده توسط پزشک خودداری نمائید. در طول درمان به طور منظم تحت نظر پزشک قرار گیرید. یعنی و کارائی این دارو در کودکان کمتر از ۴ سال ثابت نشده است، لذا از مصرف آن در این گروه سنی خودداری نمائید. در صورت نیاز به مصرف طولانی مدت حتماً به پزشک خود مراجعه نمایید. از انجام واکسیناسیون در طی مصرف این دارو پرهیز نمائید. در صورت عدم بهبودی پس از ۳ هفته حتماً به پزشک خود مراجعه نمایید. در صورت پیدایش هر گونه عفونت در بینی، گلو و یا سینوس ها به پزشک خود مراجعه نمایید. یک ماه پس از باز شدن درپوش ظرف، باقیمانده را دور بریزید. پس از هر بار مصرف درپوش ظرف را محکم ببندید.