

Hyoscine-N-Butyl Bromide

هیوسین - ان - بوتیل بروماید

شکل دارویی: آمپول ۲۰ میلی گرم در میلی لیتر (۱ میلی لیتری)

دسته دارویی: ضد اسپاسم (آنتی کولینرژیک)

موارد مصرف و آثار درمانی:

کاهش اسپاسم گوارشی و اسپاسم دستگاه ادراری - تناسلی، سندروم روده تحریک پذیر یا IBS، ترشحات بیش از حد دستگاه تنفسی، کولیک روده، دردهای قاعدگی، اسپاسم حاد همچون کولیک صفراوی و کلیوی، برای تشخیص انسداد و کاهش اسپاسم در روشهای تشخیصی (رادیولوژی) از جمله اندوسکوپی معده و روده.

هشدارها:

- افزایش فشار چشم ممکن است با استفاده از داروهای آنتی کولینرژیک از جمله هیوسین در بیمارانی که گلوکوم زاویه بسته آنها قبلاً تشخیص داده نشده است، رخ دهد. لذا در صورت پیشرفت درد، قرمزی چشم و یا کاهش بینایی بعد از تزریق این دارو، بیمار فوراً تحت نظر چشم پزشک قرار گیرد.
- با تزریق آمپول هیوسین، مواردی از آنافیلاکسی گزارش شده است؛ لذا بیمارانی که این دارو را تزریق می نمایند باید تحت مراقبت پزشک باشند.
- در صورت دردهای شدید و پیشرونده یا دردهای همراه با علائمی همچون تب، تهوع، استفراغ، تغییر در حرکات روده، حساسیت به لمس شکمی، کاهش فشار خون، غش و خون در مدفوع، تست های تشخیصی مناسب در جهت تشخیص علت باید انجام گردد.
- آمپول هیوسین ممکن است باعث تاکیکاردی، کاهش فشار خون و آنافیلاکسی شود. لذا در بیماران دارای نارسایی قلبی، یا بیماری های عروق کرونری، آریتمی قلبی یا هیپرتانسیون و جراحی قلب با احتیاط تجویز و مصرف گردد.
- به دلیل اینکه داروهای آنتی کولینرژیک تعریق را کاهش می دهند، این دارو در موارد همراه با تب، با احتیاط تجویز گردد.
- این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی و تاری دید گردد؛ لذا در حین درمان با این دارو از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری و دقت کامل دارند، خودداری نمایند.

تداخلات دارویی:

- اثرات آنتی کولینرژیک داروهای نظیر ضد افسردگی های سه حلقه ای و چهار حلقه ای، آنتی هیستامین ها، کینیدین ها، آمانتادین، آنتی سایکوتیک ها (مثل فلوئتازین ها، بوتیروفنون ها)، دیژوپیرامید، تیوتروپیوم، اپیتراتیپیوم و ترکیبات شبه آتروپین، ممکن است با مصرف هیوسین افزایش یابد.
- تاکیکاردی حاصل از داروهای بتا آدرنرژیک ممکن است توسط هیوسین افزایش یابد.
- درمان همزمان با آنتاگونیست های دوپامین همچون متوکلوپرامید، ممکن است باعث کاهش اثر هر دو دارو بر روی دستگاه گوارش گردد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

اطلاعات محدودی در خصوص مصرف هیوسین در دوران بارداری و شیردهی موجود می باشد؛ لذا مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمیگردد.

عوارض جانبی:

هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته شود، اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد، اما در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک خود مشورت کنید.

عوارض شایع عبارتند از: عدم تطابق دید، تاکیکاردی، سرگیجه، خشکی دهان، یبوست، احتباس ادراری و درد در محل تزریق.

عوارض دیگر این دارو عبارتند از: شوک آنافیلاکتیک، واکنش های پوستی (کهیر، راش، قرمزی و خارش)، تنگی نفس، میدریاز، افزایش فشار چشم، کاهش فشار خون و گرگرفتگی.

مسمومیت دارویی:

عوارض جدی در اثر مصرف دوز بالای این دارو مشاهده نشده است. با مصرف دوز بالای این دارو ممکن است عوارضی همچون احتباس ادراری، خشکی دهان، قرمزی پوست، تاکیکاردی، کاهش حرکات دستگاه گوارش و مشکلات بینایی، ایجاد گردد. در صورت شدید بودن این عوارض بیمار را به بیمارستان منتقل نمایند.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

میزان مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند؛ اما دوز معمول این دارو بدین صورت میباشد:

✓ یک آمپول به صورت عضلانی یا آهسته وریدی تزریق شده و در صورت نیاز بعد از نیم ساعت تکرار گردد.

✓ در اندوسکوپی تزریق ممکن است چند بار تکرار گردد. حداکثر دوز روزانه ۱۰۰ میلی گرم می باشد.

✓ مصرف این دارو در کودکان ممنوع می باشد.

✓ دارو را می توان به صورت عضلانی، آهسته وریدی و زیرجلدی تزریق نمود.

✓ آمپول را می توان با سرم دکستروز ۵ درصد و یا سدیم کلراید ۰/۹ درصد رقیق نمود.

موارد منع مصرف:

- در بیماران دارای میاستنی گراو، مگاکولون، گلوکوم با زاویه بسته، تاکیکاردی، بزرگی پروستات همراه با احتباس ادراری، سنگ دستگاه گوارش یا انسداد روده.
- در صورت حساسیت به هیوسین-ان-بوتیل-بروماید.
- آمپول هیوسین نباید به صورت تزریق عضلانی در بیماران تحت درمان با داروهای ضد انعقاد خون (به دلیل ایجاد همتوم) استفاده گردد.

شرایط نگهداری دارو:

دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کرده و از یخ زدگی محافظت نمایند.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها آمپول هیوسین-ان-بوتیل-بروماید ۲۰ میلی گرمی را به صورت آمپولهای ۱ میلی لیتری در پوکه های تیره، درون جعبه و به همراه برگه راهنما بسته بندی و به بازار عرضه می نماید.