

تداخلات دارویی :

تداخلات دارویی با داروی موضعی گزارش نشده است.

موارد منع مصرف :

- ✓ سابقه حساسیت به ایبوپروفن یا هریک از اجزای تشکیل دهنده فرآورده.
- ✓ سابقه واکنش های حساسیتی مثل آسم، کهیر، رینیت بعد از مصرف ایبوپروفن.
- ✓ سابقه حساسیت به آسپرین و یا داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID).
- ✓ بر روی پوست آسیب دیده.

شرایط نگهداری دارو :

دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کرده و از یخ زدگی محافظت نمایید.
دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

بسته بندی :

شرکت داروسازی رها ایبوپروفن ۵ درصد را به صورت ژل موضعی، درون جعبه بسته بندی و به بازار عرضه می نماید.

Ibuprofen 5%

ایبوپروفن ۵ درصد

شکل دارویی : ژل موضعی ۵ درصد

دسته دارویی : ضد التهاب غیر استروئیدی

موارد مصرف و آثار درمانی :

مسکن و ضد التهاب، ضد دردهای روماتیسمی، انواع آرتрит (شامل آرتريت جوانان)، دردهای ماهیچه ای، استوآرتریت زانو و دست، درد پشت، دردهای ناشی از آسیب ورزشی

راهنمایی های عمومی :

- ✓ از استفاده ژل در اطراف چشم و بر روی پوست آسیب دیده پرهیز نمائید.
- ✓ از تماس دارو با غشاهای مخاطی خودداری نمائید.
- ✓ روی موضع را بانسمان نکنید.
- ✓ بدتر شدن نقص عملکرد کلیه در افراد با سابقه این بیماری، گزارش شده است؛ لذا در صورت نقص عملکرد کلیه دارو با احتیاط و فقط با نظر پزشک متخصص استفاده گردد.
- ✓ پس از استفاده بلافاصله دستان خود را بشوئید و به دلیل احتمال ایجاد حساسیت زانی به نور آفتاب، در معرض نور شدید خورشید قرار نگیرید.
- ✓ در صورت سابقه حساسیت به این دارو، قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنید.

مصرف در دوران بارداری و شیر دهی :

در دوران بارداری و شیردهی مصرف نگردد.

مقدار و نحوه مصرف دارو :

روزی ۳ تا ۴ بار به محل مورد نظر بمالید و به آرامی ماساژ دهید تا جذب گردد. پس از هر بار مصرف دستان خود را بشوئید.
در هر بار مصرف می توان ۵۰ تا ۱۲۵ میلی گرم (۴ تا ۱۰ سانتی متر) از ژل را به موضع مالید.
از مصرف بیش از ۴ بار در روز خودداری نمائید.
در افراد کمتر از ۱۴ سال فقط با نظر پزشک مصرف گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته شود، اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد، در صورت بروز هریک از آنها با پزشک خود مشورت کنید.
استفاده از میزان بالای داروی موضعی باعث جذب سیستمیک و ایجاد عوارض سیستمیک از جمله افزایش حساسیت و آسم می گردد.