

Isoten® Isotretinoin

ایزوتن®

ایزوترتینوئین

شکل دارویی: ژل موضعی ۰/۰۵ درصد

دسته درمانی: مشتق اسید رتینوئیک

اثر درمانی:

❖ ضد آکنه ، تثبیت کننده کراتینیزاسیون

راهنمایی‌های عمومی:

قبل از مصرف این مکمل در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید :

۱ - در صورت سابقه حساسیت به این دارو

۲ - در صورت مصرف هرگونه داروی دیگر بویژه داروهای موضعی .

مصرف در دوران بارداری و شیر دهی:

استفاده از این ژل در دوران بارداری و شیر دهی ممنوع است . ژل موضعی ایزوتن در گروه C از طبقه بندی FDA قرار دارد .

موارد منع مصرف :

✓ سابقه حساسیت به این دارو .

✓ در دوران حاملگی یا شیردهی .

✓ کودکان (تا قبل از سن بلوغ) مگر با صلاحدید پزشک متخصص.

✓ در بیماران دچار روزاسه یا درماتیت پری ارال .

✓ بیماران با سابقه سرطان پوست غیر ملانوم.

هشدارها

✓ در صورت ابتلا به آکنه ولگاریس در منطقه ی وسیعی از بدن از مصرف این دارو اجتناب شود .

✓ از تماس این ژل با چشم ، بینی ، دهان ، غشاهای مخاطی ، پوست آفتاب سوخته یا اگزمایی پرهیز شود .

✓ در صورت استفاده در ناحیه گردن یا کناره های بینی ، از تجمع و باقی ماندن ژل در زیر زوایا پرهیز شود و با احتیاط مصرف گردد.

✓ قرار گرفتن در نور آفتاب بدون استفاده از گرم های ضد آفتاب ممنوع است .

✓ از رفتن به سلازیوم و استفاده از لامپ UV خوداری شود .

عوارض جانبی:

هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود .اگر چه همه این عوارض اتفاق نمی افتد ، ولی در صورت بروز ممکن است نیاز به توجه پزشکی داشته باشند .

پوسته شدن و قرمزی پوست بخصوص در هفته اول درمان ، درد ، خارش ، تحریک و حساس شدن پوست ، گرم شدن ، سوزش و خشکی پوست و بصورت نادر تیگی پوست در برخی نواحی و روشن شدن آن در نواحی تیره تر و حساسیت به نور آفتاب گزارش شده است .

مقدار و نحوه مصرف دارو:

✓ یک یا دو بار در شبانه روز بصورت موضعی استعمال شود، بهترین زمان استفاده شب می باشد .

✓ بهبودی کامل با این دارو به زمان احتیاج دارد ، بعد از دو یا سه هفته علائم بهبودی به تدریج ظاهر میشود و بعد از شش تا هشت هفته بهبودی کامل حاصل میشود .

✓ این دارو فقط برای استعمال خارجی می باشد .

✓ بلافاصله بعد از مصرف ژل دست ها را بشویید .

✓ تا زمان اولین کنترل دارو توسط پزشک ، مصرف دارو را متوقف نکرده و یا مقدار دوز داروی مصرفی را تغییر ندهید .

✓ امکان دارد در ابتدای درمان با این ژل ، آکنه بدتر شود ، بدون مشورت با پزشک دارو را قطع ننمایید .

تداخلات دارویی:

استفاده همزمان از این ژل با داروهای موضعی دیگر ، صابون های خشک کننده ، لوازم آرایشی و بهداشتی خشک کننده پوست ، محصولات و لوسیون های حاوی الکل و مواد قابض ، مواد حاوی آهک و پودر پنکک ممنوع است .

توجه خاصی باید در استفاده از فرآورده های گوگرد ، رزورسینول ، یا اسید سالیسیلیک با رتین- A اعمال شود .

قبل از استفاده از این محصول به پوست بیمار بایستی استراحت داده شود و از هیچ گونه مواد آرایشی ، بهداشتی و دارویی متفرقه استفاده نگردد .

مسمومیت دارویی:

احتمال مسمومیت با مصرف این دارو بسیار کم است . در صورت استفاده موضعی بیش از حد از این محصول ، نتیجه بهتر و سریعتری حاصل نمیشود ، نتایج استفاده بیش از حد عبارتند از : قرمزی ، لایه لایه شدن و ناراحتی های پوستی .

بلعیدن و خوردن این ژل بصورت تصادفی و یا توسط کودکان علائم و عوارض جانبی مسمومیت با خوردن بیش از حد ویتامین A را نمایش میدهد و بایستی هر چه سریعتر به اورژانس مسمومیت مراجعه کرد .

شرایط نگهداری دارو:

دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کرده و از یخ زدگی محافظت نمایید و دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید .

بسته بندی:

ژل موضعی ایزوتن® حاوی ۰/۰۵ درصد ایزوترتینوئین ، در تیوپ های ۳۰ گرمی درون جعبه همراه با بروشور به بازار عرضه میشود .