

ایپرانوز[®] ۰.۰۳ درصد

Ipranose[®] 0.03 %

Ipratropium Bromide

ایپراتروپیوم بروماید

شکل دارویی: اسپری بینی (حاوی ۲۱ میکروگرم ایپراتروپیوم بروماید در هر پاف)
دسته درمانی: آنتی کولینرژیک (استنشاقی- بینی)

موارد مصرف و آثار درمانی:
درمان آبریزش بینی ناشی از سرماخوردگی یا حساسیت فصلی در بزرگسالان و کودکان بالای ۵ سال

راهنمایی‌های عمومی:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری ننمایید.
- بیش از مقدار تجویز شده دارو را مصرف نکنید.
- از تماس دارو با داخل یا اطراف چشم اکیداً خودداری کنید. در صورت تماس دارو با چشم، فوراً چشمها را چند مرتبه با آب خنک شستشو داده و در صورت ایجاد علائم درد و دوبینی به پزشک مراجعه کنید.
- به منظور جلوگیری از انتقال آلودگی، این محصول صرفاً جهت مصرف یک نفر می باشد.
- در صورت فراموشی یک دوز، بلافاصله پس از یادآوری آن را مصرف کنید. اگر به زمان مصرف دوز بعدی دارو نزدیک است، از مصرف دو برابر آن خودداری فرمایید.

مقدار و نحوه مصرف دارو:


میزان دقیق دوز روزانه را پزشک معالج، بر اساس شرایط بیمار تعیین مینماید.
دوز مصرفی:

- بزرگسالان: روزانه ۲-۳ بار و هر بار ۲ پاف در هر حفره بینی
- کودکان: روزانه ۲-۳ بار و هر بار ۲ پاف در هر حفره بینی

ابتدا اسپری را به خوبی تکان دهید. انگشت شست خود را در زیر اسپری و دو انگشت دیگر را در طرفین پمپ اسپری قرار دهید. نوک پمپ اسپری را به آرامی وارد حفره بینی کنید و یک مرتبه پمپ را فشار دهید. این کار را برای حفره دیگر بینی تکرار کنید. (مطابق شکل)

موارد منع مصرف:

در صورتی که سابقه حساسیت به داروی آتروپین یا مشتقات آن و یا به هر یک از اجزاء فرآورده را دارید از مصرف این دارو خودداری کنید.



عوارض جانبی:

هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود؛ اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت مشاهده پزشک خود را مطلع سازید.

عوارض با احتمال وقوع کم: خونریزی از بینی، خشکی بینی، درد گلو
عوارض نادر: تاری دید، درد و کرامپ شکمی، قرمزی و سوزش چشم، تشدید علائم گلوکوم زاویه بسته، اختلالات پروستات و درد و سوزش ادرار
احتمال حساسیت به این دارو وجود دارد، که علائمی همچون کهیر، آنژیوادم، راش پوستی، برونکواسپاسم و تورم ناحیه حلق و دهان را به وجود می آورد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

ایپراتروپیوم بروماید در گروه B از طبقه بندی FDA قرار دارد.
شواهد کافی برای ترشح این دارو در شیر مادر وجود ندارد بنابراین توصیه می گردد مصرف این دارو همزمان با شیردهی با احتیاط صورت گیرد.

هشدارها:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:

- در صورت سابقه حساسیت به این دارو
- در صورت ابتلا به گلوکوم با زاویه بسته
- در صورت ابتلا به هایپر پلازی پروستات
- در صورت ابتلا به انسداد گردن مثانه
- در صورتی که داروی آنتی کولینرژیک دیگری مصرف می کنید.

مسمومیت:

احتمال مسمومیت با ایپراتروپیوم به علت جذب کم از طریق دستگاه تنفسی و گوارشی بسیار کم است.

تداخلات دارویی:

مصرف همزمان با داروهای دارای خواص آنتی کولینرژیک ممکن است باعث افزایش اثر و عوارض این دارو گردد.

شرایط نگهداری:

دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت ننمایید.
دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری ننمایید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها اسپری بینی ایپراتروپیوم بروماید را با نام تجاری ایپرانوز[®] درون جعبه بسته بندی و به بازار عرضه می نماید.