

## Ketrofal® 30

Ketorolac 30 mg/ml

## کتروفال® ۳۰

کتورولاک ۳۰ میلی گرم در میلی لیتر

**ترکیبات:** کتورولاک ترومتامین

**شکل دارویی:** آمپول ۳۰ میلی گرم در میلی لیتر

**دسته دارویی:** ضد درد، ضد التهاب غیر استروئیدی

**موارد مصرف و آثار درمانی:**

ضد تب، ضد التهاب، ضد درد نسبتاً شدید و حاد و دردهای پس از جراحی.

**راهنمایهای عمومی:**

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت سابقه حساسیت به آسپرین یا دیگر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs).
- در صورت مصرف داروهای آنتی کوآگولانت ها، آسپرین یا سالیسیلات های دیگر، سایر NSAIDs ها، سفالوسپورین ها، لیتیم، متوترکسات، پلیکامایسین، پرونسید و والپروئیک اسید.
- در صورت ابتلا به بیماریهای کلیوی و افراد مسن به دلیل کاهش کلیانس کلیوی.

**هشدارها:**

- دارو را بیش از مقدار توصیه شده مصرف ننمائید.
- تزریق به صورت آهسته عمیق عضلانی و یا وریدی (حداقل طی مدت ۱۵ ثانیه) انجام گردد.
- از مخلوط کردن همزمان این دارو با مورفین، میریدین، پرومتازین و هیدروکسی زین در یک سرنگ اجتناب گردد.
- این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی، سرگیجه و یا اختلال دید گردد، لذا ضمن درمان از رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمائید.
- در صورت مشاهده ذرات خارجی از مصرف دارو خودداری نمائید.
- این دارو بیمارستانی می باشد.
- کتورولاک (با هر روش مصرفی) نباید بیش از ۵ روز استفاده شود.
- به دلیل احتمال ایجاد حوادث ترومبوتیک قلبی عروقی، انفارکتوس میوکارد و سکت، با داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs)، بیماران با سابقه بیماری های قلبی عروقی در معرض خطر بیشتری می باشند.

**مصرف در بارداری و شیردهی:**

مطالعات کافی در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری انجام نشده است و استفاده از آن توصیه نمی گردد.

این دارو در دوران شیردهی نباید مصرف گردد.

**عوارض جانبی:**

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد اما در صورت بروز

ممکن است نیاز به توجه پزشکی داشته باشند.

در صورت بروز هر یک از عوارض زیر سریع با پزشک خود تماس بگیرید:

(P.1)

عارضه شایع: ادم (تورم در ناحیه صورت، انگشتان، قسمت انتهایی پاها، قوزک پا)

عوارض با شیوع کمتر: هایپرانتسین، پورپوره آ (نقاط قرمز کوچک روی پوست همراه با کوفتگی)، راشهای پوستی

عوارض نادر: واکنشهای آنافیلاکسی، آنمی، منژیت آسپتیک، آسم، برونکواسپاسم، خونریزی از زخم ها، خونریزی از ناحیه مقعد، تاری دید، یرقان

کولستاتیک، تشنج، ادم زبان، درماتیت اگزوفولیانیو، ضعف، تب، درد پهلوی، هماچوری، ازتمسی، توهشم، کاهش شنوایی، سندرم اورمی همولیتیک،

هپاتیت، کهیر، افزایش حجم ادرار، تکرر در دفع ادرار، اولیگوریا، ادم حنجره، لکوپنی، افسردگی، نفریت، سایکوز، نارسایی کلیه، رینیت، سندرم استیون

جانسون، ترومبوسیتوپنی و وزوز گوش.

**مقدار مصرف:**

مقدار مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می کند. ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

بیماران ۶۴ - ۱۶ سال با حداقل ۵۰ کیلو گرم وزن بدن و عملکرد کلیه نرمال:

• تزریق عضلانی به صورت تک دوز ۶۰ میلی گرم و در صورت نیاز همراه فرم خوراکی این دارو یا همراه با مسکن های دیگر

• تزریق عضلانی ۳۰ میلی گرم هر ۶ ساعت

• تزریق وریدی ۳۰ میلی گرم به صورت تک دوز یا چند دوز هر ۶ ساعت

• حداکثر دوز: ۱۲۰ میلی گرم در روز

بیماران با وزن کمتر از ۵۰ کیلوگرم یا نارسایی در عملکرد کلیه:

• تزریق عضلانی به صورت تک دوز ۳۰ میلی گرم و در صورت نیاز همراه فرم خوراکی این دارو یا همراه با مسکن های دیگر

• تزریق عضلانی ۱۵ میلی گرم هر ۶ ساعت

• تزریق وریدی ۱۵ میلی گرم به صورت تک دوز یا چند دوز هر ۶ ساعت

• حداکثر دوز: ۶۰ میلی گرم در روز

• ایمنی مصرف این دارو در بیماران کمتر از ۱۶ سال اثبات نشده است.

**موارد منع مصرف دارو:**

- نقص عملکرد کلیه
- بیماران مشکوک به خونریزی مغزی
- حساسیت به این دارو یا آسپرین و دیگر داروهای گروه NSAIDs
- تزریق Epidural یا Intrathecal
- در زمان زایمان
- استفاده در درمان دردهای حین جراحی گرافت عروق کرونر (CABG).
- کتورولاک نباید قبل از جراحی های بزرگ به منظور پیشگیری از دردهای پس از جراحی و زمانی که کنترل خونریزی از اهمیت بالایی برخوردار است، استفاده گردد.
- کتورولاک ممکن است باعث زخم معده و خونریزی گوارشی خطرناک گردد، لذا مصرف این دارو در بیماران با زخم گوارشی فعال، خونریزی اخیر دستگاه گوارشی و یا سابقه آن منع مصرف دارد. در سالمندان خطر بیشتری نسبت به عوارض گوارشی وجود دارد.

**شرایط نگهداری:**

- دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.
- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایند.

**بسته بندی:**

شرکت داروسازی رها کتورولاک را با نام تجاری کتروفال®، به صورت آمپول ۱ میلی لیتری در جعبه های ۱۰ عددی و به همراه برگه راهنما عرضه

می نماید.

(P.2)