شرکت داروسازی رها
RAHAPHARMA. Co.

لوودوپا- سی فورت

Levodopa-C Forte

شکل دارویی: قرص

ترکیبات: لوودوپا ۲۵۰ میلی گرم و کربی دوپا (بصورت مونوهیدرات) ۲۵ میلی گرم

دسته دارویی: ضد پارکینسون (مهارکننده دکربوکسیلاز / پیش ساز دوپامین)

موارد مصرف: درمان پارکینسون

هشدارها:

- مصرف این دارو می‌تواند منجر به کمبود ویتامین B_9 در بدن و بروز تشنج‌های ناشی از کمبود این ویتامین (بویژه در پی مصرف دوزهای بالا) گردد. علائم کمبود ویتامین B_9 عبارتند از کم‌خونی، شیلوز (ترک و التهاب گوشه لب)، التهاب زبان، گیجی، درماتیت و نوروپاتی. لذا توصیه می شود سطح ویتامین B_9 در بیماران پیش از شروع مصرف، بصورت دوره‌ای در طول درمان و در صورت بروز علائم کمبود آن، ارزیابی شود و در صورت نیاز، با مشورت پزشک مکمل ویتامین B_9 مصرف شود.
- قبل از مصرف این دارو در صورت وجود هر یک از موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:
  - ✓ سابقه حساسیت به هر نوع دارو، غذا، ماده رنگی یا ماده محافظ
  - ✓ ابتلا به بیماریهایی نظیر نارسایی قلبی و گلوکوم، ملانوما، افسردگی، سکته قلبی، آریتمی، سابقه زخم معده، سایکوز، نارسایی ریوی، نارسایی کلیوی، احتباس ادرار، اختلال غدد درون ریز.
  - ✓ در صورت مصرف هر گونه دارو از جمله هالوپریدول، داروهای فنوتیازین ها، تیوگزانتین ها و غذاهای غنی از پروتئین.
- در صورتی که در حال مصرف داروهای مهارکننده آنزیم مونوآمین اکسیداز (MAOIs) از جمله فنلزین، سلژیلین، ترانیل‌سیپرومین، ایزوکربوکسازید و موکلوبماید هستید، پیش از شروع مصرف این دارو به پزشک خود اطلاع دهید. زیرا بین آخرین دوز مصرف این داروها با داروی لوودوپا-سی فورت باید حداقل ۱۴ روز فاصله زمانی وجود داشته باشد. مصرف این دارو در درمان علائم خارج هرمی ناشی از سایر داروها، توصیه نمی شود. در صورتیکه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را مصرف نمایید اما در صورت نزدیک بودن زمان مصرف نوبت بعدی، نوبت فراموش شده را مصرف نکنید و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.
- مصرف این دارو ممکن است سبب بروز گیجی و خواب آلودگی گردد لذا ضمن درمان با این دارو از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید. احتمال افت فشار وضعیتی و سرگیجه هنگام تغییر وضعیت وجود دارد، بنابراین وقتی از حالت نشسته به ایستاده تغییر وضعیت می دهید، احتیاط کنید. از مصرف این دارو با غذاهای غنی از پروتئین خودداری نمایید. در صورت قطع مصرف یا کاهش ناگهانی دوز دارو، احتمال ابتلا به سندروم نورولپتیک (NMS) وجود دارد. از قطع مصرف ناگهانی و کاهش سریع دوز مصرفی خودداری نمایید. مصرف این دارو ممکن است باعث تغییر رنگ مایعات بدن مانند ادرار، بزاق و عرق گردد.

مقدار و نحوه مصرف:

- مقدار دقیق مصرف دارو توسط پزشک و بر اساس شرایط بیمار تعیین می گردد.
- در اولین دوره مصرف، برای کاهش عوارض گوارشی دارو را با غذا مصرف کنید.
- بهترین زمان مصرف دارو یک ساعت قبل یا بعد از غذا است.

اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه ، واحد ۱۱
تلفن: ۳۶۵۴۰۶۵۹-۳۱(۹۸+) ۳۶۵۴۰۸۵۹-۳۱(۹۸+)
صندوق پستی: ۵۶۷-۸۱۷۴۵
فکس: ۳۶۵۴۰۹۵۹-۳۱(۹۸+)
www.rahapharm.com

TAB.LFT.LDC/075.05

شرکت داروسازی رها
RAHAPHARMA. Co.

- مقدار مصرف این دارو باید به صورت تدریجی افزایش یا کاهش داده شود.
- حداکثر اثر دارو ممکن است پس از چند هفته یا چند ماه بعد از شروع مصرف دارو، آغاز گردد.
- دارو را طبق دستور پزشک مصرف نمایید و از قطع مصرف ناگهانی و بدون تجویز پزشک خودداری نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

از مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی مگر با صلاحدید پزشک متخصص، خودداری نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز گردد، اگر چه همه ی این عوارض در یک فرد رخ نمی دهد اما در صورت بروز هر یک از این عوارض به پزشک خود اطلاع دهید:
آتاکسی (اختلال در هماهنگی حرکات بدن از جمله عدم تعادل، ناهماهنگی در حرکات دست‌ها، اختلال در تکلم، لرزش)، حرکات دیستونیک (حرکات غیرارادی و تکرارشونده)، بی قراری، اضطراب، گیجی، توهم، سرگیجه، خستگی، تهوع، استفراغ، نوروپاتی محیطی، ضعف، تاری دید، گرگرفتگی، گشادی مردمک، افسردگی، تپش قلب، راش پوستی، افزایش یا کاهش وزن، افت فشار خون وضعیتی، احتباس ادرار، ادم، ناراحتی گوارشی، تیرگی ادرار، بزاق یا عرق.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود هر یک از موارد زیر، از مصرف این دارو خودداری نمایید:

- حساسیت به لوودوپا، کربی دوپا یا هر یک از اجزای فرآورده
- از مصرف همزمان با داروهای مهار کننده غیر انتخابی مونو آمین اکسیداز (MAOIs) (فنلزین، سلژیلین، ترانیل‌سیپرومین، ایزوکربوکسازید) و تا ۱۴ روز پس از قطع مصرف این داروها از مصرف لوودوپا-سی فورت خودداری نمایید.
- ابتلا به گلوکوم زاویه بسته

تداخلات:

چنانچه هر یک از داروهای زیر را مصرف می نمایید، قبل از مصرف این دارو به پزشک خود اطلاع دهید:
داروهای کاهنده فشار خون، داروهای ضد افسردگی، آنتی کولینرژیک ها، آهن، آنتی سایکوتیک ها، فنی توئین و فوس فنی توئین، ایزونیازید، مهار کننده های مونو آمین اکسیداز (MAOIs)، متیونین، متیل فنیدات، متوکلوپرامید، پیریدوکسین، دروکسی دوپا.

شرایط نگهداری:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها قرص لوودوپا - سی فورت را به صورت بلیستر و درون جعبه عرضه می نماید.

اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه ، واحد ۱۱
تلفن: ۳۶۵۴۰۶۵۹-۳۱(۹۸+) ۳۶۵۴۰۸۵۹-۳۱(۹۸+)
صندوق پستی: ۵۶۷-۸۱۷۴۵
فکس: ۳۶۵۴۰۹۵۹-۳۱(۹۸+)
www.rahapharm.com
TAB.LFT.LDC/075.05