

عوارض جانبی:

این دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته زیر بشود، گرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد ولی در صورت بروز ممکن است نیاز به توجه پزشکی داشته باشند:

واکنش های آلرژیک مثل راش، خارش، تنگی نفس، گرفتگی در قفسه سینه، آماس دهان، صورت و لبها، سرگیجه موقتی یا دائمی.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

- میزان دقیق مصرف را پزشک معالج تعیین می نماید، بطور معمول برای افراد ۶ سال به بالا، روزانه ۱ قرص مصرف گردد.
- درست قبل از استفاده، قرص را از روکش خود بیرون آورید.
- قرص را روی زبان بگذارید؛ نبلعید، قرص به سرعت حل می شود. قرص را با یا بدون آب میتوانید استفاده کنید.

مسمومیت دارو:

اگر بیش از مقدار تجویز شده این دارو را مصرف کرده اید، فوراً به بیمارستان مراجعه کنید.

شرایط نگهداری دارو:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد، در ظروف در بسته و محکم نگهداری کنید. دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها قرص لوراتادین باز شونده در دهان را در بلیستر و درون جعبه به بازار عرضه می نماید.

- هر قرص لوراتادین باز شونده در دهان حاوی ۱۰ میلی گرم لوراتادین می باشد.

Loratadine 10

لوراتادین ۱۰

ترکیبات: لوراتادین ۱۰ میلیگرم

شکل دارویی: قرص باز شونده در دهان

دسته درمانی: آنتی هیستامین سه حلقه ای

اثر درمانی: درمان علامتی رینیت آلرژیک فصلی، درمان کهیر مزمن ایدیوپاتیک، آبریزش بینی و عطسه.

راهنمایهای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید. قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت نمایید:

- در صورت سابقه حساسیت به این دارو یا دیگر داروهای آنتی هیستامین
- در صورت نیاز به مصرف سایر داروها از داروساز یا پزشک خود در مورد تداخل آن با لوراتادین سوال کنید.
- بارداری یا دوران شیردهی.
- مشکلات کبدی و یا کلیوی.
- مصرف سایر داروها (حتی داروهای گیاهی).
- سابقه حساسیت دارویی یا هرگونه سابقه حساسیتی شدید.
- سعی کنید به طور مرتب به پزشک مراجعه نمایید، زیرا در این صورت روند درمان بهتر کنترل میشود.

مصرف دارو در دوران بارداری و شیردهی:

با نظر پزشک مصرف شود (گروه B).

هشدارها:

- جهت ادامه درمان و تغییر دوز دارو حتماً به پزشک خود مراجعه کنید. دارو را بیشتر یا کمتر از مقدار تجویز شده توسط پزشک مصرف ننمایید
- و از قطع خودسرانه دارو خودداری کنید. به منظور بررسی پیشرفت درمان به طور منظم به پزشک مراجعه کنید.
- مصرف این دارو در بیماران پایین تر از ۶ سال ممنوع است.
- لوراتادین با داروهای سایتمیدین، کتوکونازول و اریترومايسين تداخل دارد؛ از مصرف همزمان این داروها بپرهیزید و با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- به علت احتمال بروز سرگیجه و خواب آلودگی، هنگام رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری دارند، احتیاط نمایید.