

بر لایه اپیتلیال (dendritic keratitis) • وجود عفونت چشمی مانکوباکتریال • لبلا به بیماری های ویروسی مانند واکسینیا، اریسلا و سایر بیماری های ویروسی قرنیه و کونژنیتیویت مقدار و نحوه مصرف: • مقدار مصرف را پیشک مالاج تعیین میکند. میزان مورد نیاز معمولاً برای بالغین ۱ تا ۲ قطره هر ۴ تا ۶ ساعت میباشد. • ممکن است ۲۲ تا ۴۸ ساعت اولیه درمان هر یک تا دو ساعت باشد. • قطره را قلیل از مصرف به شدت تکان دهید. • بدون مشورت با پزشک مصرف دارو را قطع نکنید. • پس از پهلوی مصرف قطره را به آرامی کاهش دهید. • برای مصرف دارو سر را قدری به سمت عقب خم کنید. پلاک باین را انگشت گرفته و مقداری به سمت جلو بکشید. (شکل ۱). یک قطره از محلول را در حفره پلاک باین بچکانید (شکل ۲)، در حالی که سمت باین را نگاه می کنید چشم را به آرامی پیندید (شکل ۳). به مدت ۵-۱۰ دقیقه گوشه چشم خود را به کمک انگشت اشاره به سمت پینی فشار دهید. چشم را سته نگه دارد و داروی اضافی خارج شده را با دستمال تمیز باک کنید (شکل ۴). از تماس نوک قطره چکان با چشم یا بر سطح دیگری خودداری کنید. در صورت استفاده از لنز تعامی نرم قلیل از مصرف دارو لنز را از چشم خود بخراج نموده و ۱۵ دقیقه بعد از مصرف دارو مجددآن را در چشم قرارهید. در صورت نیاز به استفاده از داروهای چشمی دیگر بین مصرف آن ها بین دارو ۱۰ دقیقه فاصله دهید. در صورت فرمومی استفاده در یکی از نوبت ها، دارو را به مختص یادآوری مصرف کنید، ولی از دو برابر کردن مقدار مصرف خودداری نمایید.



عوارض جانبی: هر دارو به موارات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته ای بشود؛ اگرچه همه این عوارض با هم اتفاق نمی افتد، در صورت مشاهده عوارض با پزشک خود مشورت نمایید.
عوارض شایع بارترنداز: افزایش فشرل داخل چشم، التهاب چشم (قرمزی، سوزش و ناتراحتی سطحی چشم) عوارض کمتر شایع عبارت از قدرتی ناشی از کوتانکتیویت (قرمزی اطراف چشم)، اسپس به گفته کلشند، تورم و سوزش چشم، مشکلات پلاک (سوزش، خارش، تورم، درد و قرمزی)، علامت حساسیت (تپ، کهربا، افزایش ضربان قلب، تنگی نفس، درد مفاصل، تورم صورت، پا، دست و پا، خارش و تورم اطراف چشم، ابزیرش، سیستم چشمی (تاری دید، دیدن هاله سبز یا آبی به دور ایجاد، خشکی چشم، حساسیت به نور) عوارض نادر عبارتند از: غفت باکتریالی پشم، عوارضی که در سورت تفاوت نیاز به توجه پیشکی دارند: سوزش، سردرد، خارش، خشکی چشم، حساسیت به نور، احساس گرگش شرایط نگهداری: دارو را به حالت استهade در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از زدگی محافظت نمایید. • دارو را دور از سیسترس اطفال نگهداری نمایید. • باقیمانده دارو را یک ماه پس از باز شدن در پیش طرف برای اولین بار، دور بزیرید.
بسته بندی: شرکت داروسازی رها قطره استریل چشمی لوترة-تی (لوتیریدول اتابونات ۰/۵ درصد/توبیرامایسین ۰/۳ درصد) را در ظروف پای اینلینی، درون جعبه و به همراه برگه راهنمای عرضه می کند.

لوترة®-تی

Loteprednol etabonate 0.5% / Tobramycin 0.3%
لوتیریدول اتابونات ۰/۵ درصد / توبیرامایسین ۰/۳ درصد

شكل دارویی: قطره استریل چشمی، سوسپانسیون

دسته دارویی: آنتی بیوتیک، کورتیکو استروئید

مواد مصرف و آثار دارمانی: درمان التهاب و عفونت چشم (التهاب پاسخ دهنده به کورتیکو استروئید در صورتی که همراه با عفونت باکتریایی باشد یا احتمال عفونت با تریاپی وجود داشته باشد.) این دارو برای بیماری فلیمی نیما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنمایی های عمومی: در موارد زیر با پزشک یا داروپاز مشورت نمایید:

- در صورت داشتن سایقه الربایی به این قطره ایزی از اجزای آن • در صورت سایقه الربایی به کورتیکو استروئیدهای دیگر • در صورت سایقه بیماری های ملکوم یا افزایش شدای این قطره های دسته ای آمینوگلیکو زید • در صورت سایقه بیماری های ملکوم یا کورتیکو استروئیدهای دسته ای آمینوگلیکو زید در صورت سایقه بیماری های ملکوم چشم از جمله هرپس، اریسلا، واکسینیا در صورت مصرف آن در دوران بارداری و شیردهی: در گروه C از طبقه بندی FDA قرار میگیرد. در صورت نیاز به مصرف، با ملاحدید پزشک و با مقایسه منافع و مضرات دارو، مصرف گردد.

هشدارها: • استفاده از کورتیکو استروئیدها پس از جراحی آب مولوید ممکن است بهود زخم را تاخیر بیندازد و منجر به ایجاد برآمدگی گردد. • طور کلی این قطره سایده بیشتر از هد روز طور مدام استفاده گردید. مگر آنکه فشرل داخلی چشم توسط پزشک پروری گردد. • استفاده بلده مدت این قطره ای از قدره های دیگر چشمی گوایی استروئید، منجر به عوارض جسمی از جمله ملکوم یا افزایش شدای این قطره چشمی، آسیب عصب بینایی، اختلال بینایی و آب مولوید می گردد. • این قطره در بیماری های که باعث نگشیدن چشم را وصلی چشم (sclera) می شود باستی با احتیاط مصرف گردد زیرا می تواند منجر به پارکینسون یا نوکری گردد. • استفاده از این قطره در بیماری های عفونی حاد چشم می تواند عالم را پوشانده با شرایط را برای وجود باکتری های تسهیل کند. • این قطره چشمی حاوی بنز الکونین کاربید به عنوان نگهدارنده است که باعث نگشیدن لنزهای تماسی می شود قبل از استفاده از این قطره لزیهای تماسی خود را از چشم خارج کرده و حداقل ۱۵ دقیقه سی از استفاده از دارو، آنها را درون چشم قرار ندهید. • همه قطره های چشمی باعث تاری دید می شوند، که این امر به سرعت رفع می شود. تا دید شما واضح نشده است، رانندگی نکنید. • در صورتی که همزمان با سایر آنتی بیوتیک های آمینوگلیکو زیدی مصرف شود، غلظت سرمی توبیرامایسین باستی پایش گردد. • آمینو-

اتریخشی این دارو به اینیات نرسیده است.

موارد منع مصرف: • در صورت حساسیت به لوتیریدول، توبیرامایسین یا هر یک از اجزاء فرآورده وجود هر گونه عفونت قارچی در چشم • کراتیت به علت وجود عفونت ویروسی هرپس سیمپلکس