لوترا® ۰/۵ درصد

Lotera® 0.5 %

لوتپردنول اتابونات

Loteprednol Etabonate

شکل دارویی : قطره استریل چشمی، سوسپانسیون

دسته دارویی : کورتیکو استروئید

● موارد مصرف و آثار درمانی :

کونژنکتیویت، آلرژی فصلی، التهابات بعد از جراحی چشم، کراتیت ناشی از هرپس زوستر چشمی، التهابات عنبیه، قرنیه و پلک

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

● راهنمایی‌های عمومی :

در موارد زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید :

- در صورت داشتن سابقه آلرژی به این دارو یا هر یک از اجزای آن
- در صورت سابقه آلرژی به کورتیکو استروییدهای دیگر
- در صورت سابقه بیماری های ویروسی چشم از جمله هرپس، واریسلا ، وکسینیا
- درصورت سابقه بیماری های چشمی از جمله مایکو باکتریوم چشمی و قارچ چشمی

● مصرف در دوران بارداری و شیر دهی :

در گروه C از طبقه بندی FDA قرار میگیرد، در صورت نیاز به مصرف، با صلاحدید پزشک و با مقایسه منافع و مضرات دارو، مصرف گردد.

● هشدارها و موارد منع مصرف :

- در صورت داشتن گلوکوم، حتما به چشم پزشک خود اطلاع دهید.
- در صورت گسترش و تشدید بیشتر درد، خارش، قرمزی و التهاب به چشم پزشک مراجعه کنید.
- در صورتی که علائم شما بعد از دو روز بهبود نیافت، به پزشک خود مراجعه کنید تا مجدداً معاینه شده و مورد ارزیابی قرار گیرید.
- بطور کلی از این قطره نباید بیشتر از ده روز بطور مداوم استفاده گردد، مگر آنکه فشار داخل چشم توسط پزشک بررسی گردد.
- استفاده بلند مدت از این قطره یا قطره های دیگر چشمی حاوی استروئید، منجر به عوارض چشمی از جمله گلوکوم یا افزایش فشار داخل چشمی، آسیب عصب بینایی، اختلال بینایی و آب مروارید میگردد.

اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه ، واحد ۱ ، صندوق پستی: ۵۶۷-۸۱۷۴۵ تلفن: ۰۳۱۳۵۴۰۶۵۶۹ (۰۹۸)
(۰۹۸)۳۱۰۳۶۵۴۰۸۵۱ فکس: ۰۳۱۳۶۶۵۴۰۹۵۱ (۰۹۸)
www.rahapharm.com

- این قطره چشمی حاوی بنز الکانیوم کلراید به عنوان نگهدارنده است که باعث تغییر رنگ لنزهای تماسی میشود. قبل از استفاده از این قطره ، لنزهای تماسی خود را از چشم خارج کرده و حداقل ۱۵ دقیقه پس از استفاده دارو ، آنها را درون چشم قرار ندهید.
- همه قطره های چشمی باعث تاری دید میشوند، که این امر به سرعت رفع میشود. تا زمانی که دید چشمانتان واضح نشده است، رانندگی نکنید.



● مقدار و نحوه مصرف دارو :

- قطره لوترا® را قبل از مصرف به شدت تکان دهید.
- مطابق تصویر پلک خود را به پایین بکشید. (شکل ۱)
  و در گوشه چشم یک یا دو قطره بچکانید. (شکل ۲).
- مقدار مصرف را پزشک معالج تعیین میکند. میزان مورد نیاز معمولا برای بالغین ۴ بار در روز هر بار ۱ تا ۲ قطره میباشد و درمان تا یک یا دو هفته ادامه می‌یابد و این بستگی به نظر پزشک معالج دارد.
- از تماس نوک قطره چکان با چشم و محل های گوناگون و آلودگی آن خودداری کنید.
- درصورت آلودگی نوک قطره چکان ، با گاز استریل آن را پاکیزه نمایید و از ریختن قطره به طور مستقیم روی مردمک یا قرنیه خودداری کنید.

● عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته ای بشود؛ اگرچه همه این عوارض با هم اتفاق نمی افتد، در صورت مشاهده عوارض با پزشک خود مشورت نمایید.

عوارض نسبتا شایع عبارتند از:

تاری دید یا تغییر دربینایی به صورت موقت، قرمزی و التهاب موقتی چشم، حساسیت چشم به نور، التهاب ملتحمه

عوارض نادر عبارتند از:

ترشحات چشم، درد و خارش چشم، قرمزی پلک و قسمت داخلی پلک، برجستگی های کوچک در قسمت داخلی پلک.

● شرایط نگهداری دارو :

- دارو را به حالت ایستاده و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
- دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.
- باقیمانده دارو را یک ماه پس از باز شدن درپوش ظرف برای اولین بار، دور بریزید.

● بسته بندی :

شرکت داروسازی رها قطره استریل چشمی لوترا® ۰/۵ درصد (لوتپردنول اتابونات) را در ظروف پلی اتیلنی ۵ میلی لیتری، درون جعبه و به همراه برگه راهنما عرضه می کند.

EYE LFT.LTR 0.5/007. 13

اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه ، واحد ۱ ، صندوق پستی: ۵۶۷-۸۱۷۴۵ تلفن: ۰۳۱۳۵۴۰۶۵۶۹ (۰۹۸)
(۰۹۸)۳۱۰۳۶۵۴۰۸۵۱ فکس: ۰۳۱۳۶۶۵۴۰۹۵۱ (۰۹۸)
www.rahapharm.com