

مقدار و نحوه مصرف:

این دارو می تواند به صورت تزریق عمیق عضلانی و تزریق Intralesional مصرف گردد.

لیشمانیوز احشایی: تزریق عضلانی ۲۰ میلی گرم آنتی مونی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز معادل ۷۵ میلی گرم مگلو مین آنتی مونات به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز (حداکثر تا ۸۵۰ میلی گرم آنتی مونی) به مدت حداقل ۲۰ روز متوالی. درمان باید تا زمانی که انگل به طور کامل (در نمونه حاصل از آسپیره طحال در فواصل ۱۴ روزه) حذف گردد، ادامه یابد.

لیشمانیوز جلدی:

لیشمانیوزهایی به جز برزیلی و آمازون: تزریق Intralesional حتما باید در مراحل اولیه ایلتا انجام شود و تا هنگامی که زمینه ضایعه سفید گردد، باید ادامه یابد. اما در صورتی که ضایعات متعدد، ملتهب یا زخم شده باشد یا در محلی باشد که ایجاد تغییر شکل یا ناتوانی اعضا و یا انسداد مجاری لنف وجود داشته باشد، بایستی به شکل سیستمیک درمان شود.

- درمان موضعی: تزریق Intralesional، ۱ تا ۳ میلی لیتر در ریشه ضایعه و سپس یک تا دو بار به فاصله یک تا دو روز تکرار شود.
- درمان سیستمیک: تزریق عضلانی ۱۰ تا ۲۰ میلی گرم آنتی مونی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز معادل ۲۷ تا ۷۵ میلی گرم مگلو مین آنتی مونات به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز تا چند روز پس از مشاهده علائم بهبودی یا عدم وجود انگل در اسمیر slit-skin.
- لیشمانیوز برزیلی (جلدی و جلدی-مخاطی) و لیشمانیوز آمازونی (مخاطی): ۲۰ میلی گرم آنتی مونی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز معادل ۷۵ میلی گرم مگلو مین آنتی مونات به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز (حداکثر تا ۸۵۰ میلی گرم آنتی مونی) تا زمان درمان ضایعه (حداقل ۴ هفته برای لیشمانیوز برزیلی و چندین ماه برای لیشمانیوز آمازونی)
- هر آمپول برای یکبار مصرف است. باقیمانده محلول را پس از مصرف، دور بریزید.

تداخلات دارویی:

مورد خاصی گزارش نشده است.

مسمومیت:

دوز بالای دارو ممکن است منجر به کبد (یرقان حاد)، آسیب به کلیه (نارسایی حاد)، آسیب به قلب (برادیکاردی، افزایش فاصله QT، تغییرات موج T، بزرگ شدن قلب) و اختلالات عصبی (مانند پلی نوریت) گردد.

موارد منع مصرف:

- در صورت حساسیت به دارو یا هر یک از اجزاء آن
- در صورت ابتلا به نارسایی کبد، کلیه یا قلب

شرایط نگهداری:

- دارو در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری کنید و از یخ زدگی محافظت نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها آمپول مگلو مین آنتی مونات را در پوکه های ۵ میلی لیتری و جعبه های مقوایی ۵ عددی عرضه می نماید.

Meglumine Antimoniate

1.5 g/5 ml

مگلو مین آنتی مونات

۱٫۵ گرم در ۵ میلی لیتر

تزکیبات در ۵ میلی لیتر:

مگلو مین آنتی مونات ۱٫۵ گرم
(معادل آنتی مونی: ۰٫۴۰۵۰ گرم)

شکل دارویی: ۵ میلی لیتر محلول تزریقی

دسته دارویی: ضد انگل (Antiprotozoa) - ضد لیشمانیوز

موارد مصرف و آثار درمانی: درمان لیشمانیوز احشایی (کالآزار) و لیشمانیوز جلدی (به جز لیشمانیوز اتوپیک)

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف دارو در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید:

- در صورت سابقه حساسیت به این دارو
- در صورت مصرف هر گونه داروی دیگر

هشدارها و موارد احتیاط:

- محلول باید شفاف باشد. لذا چنانچه ذرات ریز در آن مشاهده شد آمپول را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید. در صورتی که ذرات باقی ماندند، از مصرف آمپول خودداری نمایید.
- در زمان درمان با این دارو بایستی از رژیم غذایی پر پروتئین استفاده شود.
- در صورت وجود هرگونه کمبود مواد مغذی از جمله کمبود آهن در بدن، پیش از شروع درمان باید این کمبودها جبران شود.
- در طول درمان با این دارو، باید عملکرد کلیه و کبد، نوار قلب و فاکتورهای خونی بیمار، تحت پایش باشد و در صورت مشاهده نتایج غیرطبیعی دوز دارو کاهش یابد.
- در صورت مشاهده علائم همچون سرخه، استفراغ و درد موضعی در طول تزریق، دریافت دارو را متوقف کنید.
- در صورت نیاز به افزایش دوز دارو بایستی این کار به آهستگی صورت گیرد.
- این دارو حاوی سولفیت است بنابراین ممکن است موجب بروز واکنش های آلرژیک یا برونکواسپاسم شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مطالعات کافی در این زمینه صورت نگرفته است. در حالی که لیشمانیوز احشایی در برخی موارد تهدید کننده حیات است. بنابراین در این شرایط بایستی فواید و مضرات مصرف دارو بررسی گردد.

عوارض جانبی:

هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. گرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد، ولی در صورت بروز ممکن است نیاز به توجه پزشکی داشته باشند.
عوارض گزارش شده از این دارو شامل موارد ذیل است:
اختلالات اسکلتی-عضلانی، سردرد، خستگی، تنگی نفس، بیثبات جلدی، تورم صورت، درد شکمی، افزایش آنزیم های کبدی، پانکراتیت، نارسایی حاد کلیه، آریتمی، افزایش فاصله QT و تغییر موج T در نوار قلب.