نفازولین Naphazoline

شکل دارویی: قطره استریل چشمی

ترکیبات: نفازولین هیدروکلراید ۰/۱ درصد

دسته دارویی: منقبض کننده عروقی (آلفا - ۱ آگونیست)

موارد مصرف :

- تسکین قرمزی چشم ناشی از تحریک های خفیف مانند آلرژن ها
- تسکین سوزش و تحریک چشم ناشی از خشکی چشم
- به عنوان محافظ در برابر تحریک یا خشکی بیشتر چشم

هشدارها:

- در صورتی که از لنز تماسی نرم استفاده می کنید باید قبل از مصرف قطره چشمی، لنز را از چشم خارج نموده و ۲۰ دقیقه بعد از مصرف قطره، لنز را داخل چشم قرار دهید. • دارو را بدون مشورت با پزشک برای مدت بیش از ۷۲ ساعت استفاده ننمائید زیرا در صورت استفاده طولانی مدت امکان عود احتقان وجود دارد. • در صورت وجود ضایعه اپی تلیایی قرینه مصرف این دارو توصیه نمی شود. • در صورت بروز درد چشم و تغییر در بینایی مصرف دارو را قطع نمائید و به پزشک خود اطلاع دهید. • در صورت ابتلا به هر نوع بیماری چشمی از جمله گلوکوم و یا سابقه عمل جراحی چشم، دارو را با احتیاط و زیر نظر پزشک مصرف نمائید. • در صورت ابتلا به مشکلات قلبی عروقی، فشار خون بالا، پرکاری تیروئید، دیابت شیرین یا وجود عفونت موضعی، دارو را با احتیاط و زیر نظر پزشک مصرف نمائید. • در صورت مصرف هرگونه دارو بویژه داروهای مهار کننده مونوآمین اکسیداز (مانند ترانیل سیپیرومین، فنلزین، ایزوکربوکسازید)، داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای و داروهای پایین آورنده فشار خون، پیش از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمائید. • در صورت تشدید یا عدم بهبود علائم پس از ۷۲ ساعت و یا بروز علائم جذب سیستمیک دارو (مانند سرگیجه، سردرد، حالت تهوع، کاهش دمای بدن، خواب آلودگی)مصرف دارو را قطع نمائید و به پزشک خود اطلاع دهید. • در صورت نیاز به استفاده همزمان از داروهای چشمی دیگر بایدحداقل ۱۰ دقیقه فاصله بین زمان مصرف دو دارو وجود داشته باشد. • در صورتیکه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فورا آن را مصرف کنید ولی اگر زمان مصرف نوبت بعدی نزدیک است، نوبت فراموش شده را مصرف نکنید و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداري نمائید. • دارو را بیشتر از مقدار تجویز شده توسط پزشک استفاده ننمائید، استفاده بیش از حد ممکن است باعث افزایش قرمزی چشم شود. • در صورت کدورت یا تغییر رنگ محلول از مصرف آن اجتناب نمائید. • هنگام مصرف از تماس نوک قطره چکان با چشم یا هر سطح دیگر خودداری نمائید. • پس از هر بار مصرف دریوش ظرف را محکم ببندید. • یک ماه پس از باز کردن دریوش ظرف از مصرف آن خودداری نمائید و باقیمانده دارو را دور بریزید. • مصرف این دارو در اطفال زیر ۱۲ سال توصیه نمی شود .

مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو توسط پزشک تعیین میگردد، اما به طور معمول میزان مصرف این دارو بدین صورت است: ۱ تا ۲ قطره هر ۳ الی ۴ ساعت یکبار داخل حفره پلک پائین چشم مبتلا، در صورت نیاز.

اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه ، واحد ۱ ، صندوق پستی ۸۱۷۴۵-۵۵۷ تلفن: ۰۳۱۳۶۵۴۰۹۵۹ (۰۹۸)
www.rahapharm.com فکس: ۰۳۱۳۶۵۴۰۹۵۹ (۰۹۸)

(Page 1)

نحوه مصرف قطره چشمی: • قبل از استفاده از قطره چشمی دستان خود را بشویید. • سر را به سمت عقب خم کنید سپس با یک دست پلک پائینی را به طرف پایین بکشید. • در حالیکه به طرف بالا نگاه می کنید با دست دیگر یک قطره داخل حفره پلک پائین بچکانید و سپس چشم را به اطراف گردانده تا قطره در تمام سطح چشم پراکنده شود. • به آرامی چشم را ببندید و به مدت ۳ الی ۵ دقیقه چشم را بسته نگه دارید و همزمان با انگشت شست گوشه چشم (سمت بینی) را به آرامی فشار دهید. • داروی اضافی خارج شده از چشم را با دستمال تمیز پاک کنید.

اگر طبق دستور پزشک باید دو قطره از دارو در چشم چکانده شود قطره دوم را باید با ۵ دقیقه فاصله در چشم بچکا نید .

شکل (۴)

شکل (۳)

شکل (۲)

شکل (۱)

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این دارو در رده C بارداری از طبقه بندی FDA قرار دارد و مصرف آن در دوران بارداری و شیر دهی باید با نظر پزشک صورت گیرد.

عوارض جانبی : هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته ای نیز بشود، اگرچه همه ی این عوارض در یک فرد رخ نمی دهد اما در صورت بروز هر یک از این عوارض با پزشک خود مشورت نمائید: تاری دید، تحریک چشم، سوزش چشم، قرمزی چشم، افزایش فشار داخل چشم، اشک ریزش، میدریاز، کراتیت نقطه نقطه.

موارد منع مصرف:

• سابقه حساسیت به نفازولین و یا هر یک از اجزای تشکیل دهنده فرمولاسیون. • مصرف همزمان با داروهای مهار کننده مونوآمین اکسیداز. • مصرف همزمان با مشتقات ارگوت. • ابتلا به گلوکوم زاویه بسته

تداخلات: چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمائید پیش از مصرف این قطره ، به پزشک خود اطلاع دهید: داروهای آلفا ۱ بلاکر، مهارکننده های مونوآمین اکسیداز، ضد افسردگی های ۳ حلقه ای، مشتقات ارگوت، داروهای سمپاتومیمتیک، آتوموکستین، محصولات حاوی کانابینوئید، کوکائین، دوکسوفیلین، گوانتیدین، لینزولید، تدیزولید .

مسمومیت: در صورت بلع تصادفی قطره نفازولین بویژه توسط کودکان، با یک مرکز کنترل مسمومیت تماس بگیرید و سریعا فرد را به بیمارستان منتقل کنید. بلع تصادفی توسط کودکان ممکن است به عوارض جانبی جدی (مانند کما، برادی کاردی، دپرسیون تنفسی، کاهش هوشیاری) منجر شود که نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارند.

شرایط نگهداری :

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمائید .

دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمائید.

بسته بندی: شرکت داروسازی رها نفازولین را بصورت قطره استریل چشمی ۱۰ میلی لیتری ، درون جعبه و به همراه برگه راهنما عرضه می نماید.

EYE.LAB.NPZ 0.1/008.08

اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه ، واحد ۱ ، صندوق پستی ۸۱۷۴۵-۵۵۷ تلفن: ۰۳۱۳۶۵۴۰۹۵۹ (۰۹۸)
www.rahapharm.com فکس: ۰۳۱۳۶۵۴۰۹۵۹ (۰۹۸)

(Page 2)