

وجود جسم خارجی در چشم، فتوفوبی (حساسیت بیش از حد به نور)، تیر کشیدن، قرمزی، خارش و یا خشکی چشم و ریزش اشک.

موارد احتیاط :

افراد با سابقه حساسیت به فلوروکینولون ها یا مشتقات آنها از جمله سینوکساسین، سیپروفلوکساسین، لومفلوکساسین، نالیدیکسیک اسید، نورفلوکساسین.

افراد که ریسک افزایش فاصله QT دارند، باید در مصرف این دارو احتیاط کنند .

مقدار و نحوه مصرف دارو :

یک تا دو قطره در چشم مبتلا، هر دو تا چهار ساعت در زمان بیداری به مدت ۲ روز، سپس یک تا دو قطره چهار بار در روز به مدت حداکثر ۱۰ روز .

مصرف در اطفال کمتر از یک سال: ایمنی و اثر بخشی آن اثبات نشده است.

مصرف در کودکان بزرگتر از یک سال: مشابه بزرگسالان .

برای مصرف دارو سر را قدری به سمت عقب خم کنید، پلک پایین را با انگشت گرفته و مقداری به سمت جلو بکشید (شکل ۱). یک قطره از محلول را در حفره پلک پایین بچکانید (شکل ۲). در حالی که سمت پایین را نگاه می کنید چشم را به آرامی ببندید (شکل ۳). به مدت ۳-۵ دقیقه گوشه داخلی چشم خود را به کمک انگشت شست به سمت بینی فشار دهید. چشم را بسته نگه دارید و داروی اضافی خارج شده را با دستمال تمیز پاک کنید (شکل ۴). از تماس نوک قطره چکان با چشم یا هر سطح دیگری خودداری کنید. در صورت استفاده از لنز تماسی نرم قبل از مصرف دارو لنز را از چشم خود خارج نموده و ۱۵ دقیقه بعد از مصرف دارو مجدداً آن را در چشم قرار دهید. در صورت نیاز به استفاده از داروهای چشمی دیگر بین مصرف آن ها با این دارو ۱۰ دقیقه فاصله دهید.



(۱)



(۲)



(۳)



(۴)

منع مصرف :

افراد که سابقه حساسیت به افلوکساسین یا هر یک از اجزاء قطره یا سایر آنتی بیوتیک های کینولونی را دارند.

شرایط نگهداری :

دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد در ظرف دربسته نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید. یک ماه پس از باز شدن درپوش ظرف، باقیمانده دارو را دور بریزید.

بسته بندی :

شرکت داروسازی رها افلوکساسین را با نام تجاری افلوراپ® ۰.۳ درصد به شکل قطره چشمی، در ظروف پلی اتیلنی، درون جعبه به بازار عرضه می کند.

Oflorap® 0.3% Ofloxacin

افلوراپ® ۰/۳ درصد افلوکساسین

شکل دارویی : قطره استریل چشمی
دسته دارویی : آنتی باکتریال (از دسته فلوروکینولون ها)
موارد مصرف و آثار درمانی :

❖ کونژنکتیویت در اثر باکتری هایی از جمله :

Enterobacter cloacae, Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis and Streptococcus pneumoniae .

❖ زخم قرنیه در اثر باکتریایی از جمله:

Propionibacterium acnes, P.aeruginosa, Serratia marcescens, S. aureus, S. epidermidis, and S. pneumoniae .

هشدارها:

- ایمنی و اثر بخشی این دارو در اطفال کمتر از یک سال به اثبات نرسیده است.
- دوره درمان را کامل کنید.
- در صورت فراپوشی یک دوز مصرف، به محض یادآوری، آن را مصرف کنید مگر اینکه به زمان مصرف دوز بعدی نزدیک باشد. از دوبار کردن دوز بعدی خودداری کنید.
- در صورت عدم بهبودی پس از ۷ روز پزشک خود را مطلع سازید.
- در صورت بروز راش و علائم آلرژیک مصرف را قطع کنید و به پزشک خود اطلاع دهید.
- به دلیل احتمال ایجاد حساسیت به نور از عینک آفتابی استفاده کرده و طولانی مدت در معرض نور خورشید قرار نگیرید
- از استفاده همزمان دارو با لنزهای تماسی نرم، خودداری کنید.
- این دارو برای تزریق داخل چشم مناسب نمی باشد.

مصرف در دوران بارداری و شیر دهی :

این دارو در دوران بارداری در گروه C از طبقه بندی FDA قرار دارد، لذا قبل از مصرف با پزشک خود مشورت نمایید. اطلاعاتی در خصوص میزان ترشح افلوکساسین (در صورت مصرف چشمی) در شیر مادر وجود ندارد.

عوارض جانبی:

❖ عوارض نادری که در صورت بروز نیاز به توجه پزشکی دارند:

سرگیجه، واکنش های افزایش حساسیت (از جمله خارش، راش، تورم صورت و لب ها، تنگی نفس، خس خس کردن و تنفس سخت)، ادم اطراف چشم و صورت، اریتمی قلبی، افزایش فاصله QT در نوار قلب، شوک آنافیلاکسی، تهوع، سندرم استیونس-جانسون، نکروز توکسیک اپیدرم (TEN)

❖ عوارض نادری که در صورت ادامه یافتن و یا ایجاد مزاحمت نیاز به توجه پزشکی دارند:

سوزش چشم، دوبینی، کونژنکتیویت یا کراتیت (قرمزی، التهاب، خارش چشم، و اطراف پلک)، درد چشم، احساس