

Rabet® Betamethasone

رابت® بتامتازون

شکل دارویی : قطره استریل چشمی، گوسی، بینی بتامتازون ۰/۱ درصد
دسته دارویی : ضد التهاب استروئیدی

موارد مصرف و آثار درمانی :

- درمان التهاب ناشی از بیماری های التهابی، حساسیت یا سایر علل
- کاهش علائم سوزش، خارش و درد در چشم، گوش و بینی

راهنمایی های عمومی :

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو از جمله کورتیکواستروئیدها یا ماده محافظ
- در صورت ابتلا به گلوکوم، آب مروارید، عفونت قرنیه، بیماریهای قارچی، بیماریهای ویروسی حاد، سل ● در صورت مصرف هرگونه دارو از جمله داروهای ضد گلوکوم، داروهای آنتی کولینرژیک از جمله آتروپین

مصرف در دوران بارداری و شیر دهی :

مصرف دارو در دوران بارداری و شیر دهی باید با نظر پزشک باشد (گروه C).

هشدارها :

- مصرف این دارو در اطفال با احتیاط و در کوتاه مدت توصیه می شود. کورتیکواستروئیدها ممکن است از رشد کودکان جلوگیری کنند. ● بهتر است در زمان مصرف دارو به علت احتمال بروز عفونت و تغییر رنگ لنز، از لنزهای تماسی استفاده نکنید. ● دارو را بیش از مقدار تعیین شده مصرف نکنید.
- در صورت عدم بهبودی پس از ۷-۵ روز درمان و یا بدتر شدن چشم، به پزشک مراجعه کنید.
- این دارو حاوی متابی سولفیت سدیم می باشد و در افراد حساس بخصوص بیماران آسماتیک ممکن است سبب تشدید حمله آسم شود. ● مصرف طولانی مدت این دارو احتمال بروز افزایش فشار داخل چشمی، گلوکوم، آسیب عصب بینایی، نقص در میدان بینایی و کاهش حدت بینایی، کاتاراکت (آب مروارید)، نازک شدن قرنیه و صلبیه و عفونت های ثانوی چشم از جمله عفونت قارچی را افزایش می دهد.
- در بیماران مبتلا به گلوکوم با احتیاط فرولان و با تجویز پزشک مصرف گردد. ● مصرف استروئیدهای موضعی در بیماریهایی که باعث نازک شدن قرنیه یا اسکار میشوند، ممکن است منجر به سوراخ شدن آنها گردد.
- مصرف طولانی مدت این دارو احتمال بروز کاتاراکت (آب مروارید) را افزایش میدهد. همچنین بعد از جراحی کاتاراکت، مصرف استروئیدها ممکن است بهبودی را به تاخیر اندازد یا احتمال تشکیل bleb را افزایش دهد.

1

- در صورت مصرف دارو برای بیش از ۱۰ روز فشار داخل چشمی باید به طور مرتب کنترل شود و چشم بیمار از لحاظ وجود علائم عفونت معاینه گردد.

مقدار و نحوه مصرف دارو :

۱ تا ۲ قطره، هر ۲-۱ ساعت با کاهش تدریجی دوز به همراه بهبود التهاب برای مصرف دارو سر را قدری به سمت عقب خم کنید. پلک پایین را با انگشت گرفته و مقداری به سمت جلو بکشید. (شکل ۱). یک قطره از محلول را در حفره پلک پایین بچکانید (شکل ۲). در حالی که سمت پایین را نگاه می کنید چشم را به آرامی ببندید (شکل ۳). به مدت ۳-۵ دقیقه گوشه چشم خود را به کمک انگشت شست به سمت بینی فشار دهید. چشم را بسته نگه دارید و داروی اضافی خارج شده را با دستمال تمیز پاک کنید (شکل ۴). از تماس نوک قطره چکان با چشم یا هر سطح دیگری خودداری کنید. در صورت استفاده از لنز تماسی نرم قبل از مصرف دارو لنز را از چشم خود خارج نموده و ۱۵ دقیقه بعد از مصرف دارو مجدداً آن را در چشم قرار دهید. در صورت نیاز به استفاده از داروهای چشمی دیگر بین مصرف آن ها با این دارو ۱۰ دقیقه فاصله دهید. در صورت فراموشی استفاده در یکی از نوبت ها، دارو را به محض یادآوری مصرف کنید، ولی از دو برابر کردن مقدار مصرفی خودداری نمایید.



عوارض جانبی: تاری دید، نازک شدن قرنیه، گلوکوم، افزایش فشار چشم، عفونت ثانویه چشمی، آسیب به اعصاب بینایی، کاتاراکت (Subcapsular)، میدریاز، گرانیث اپیتلیال، پتوزیس، کلسیفیه شدن قرنیه. به دنبال مصرف این دارو در بینی ممکن است عوارض زیر رخ دهد: احساس ناراحتی در بینی، خشکی بینی، عطسه، سردرد، سبکی سر، کهیر، تهوع، خونریزی، احتقان راجعه، آسم برونشیل، زخم و پرفوراسیون تیغه میانی بینی، اختلال در حس بویایی.

شرایط نگهداری دارو :

- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایند. ● یک ماه بعد از باز کردن در ظرف، باقیمانده دارو را دور بریزید. ● دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایند.

بسته بندی: شرکت داروسازی رها بتامتازون را با نام تجاری رابت® بصورت قطره ۵ میلی لیتری شفاف در جعبه به همراه برگه راهنما عرضه می نماید. هر ۱۰۰ میلی لیستر قطره حاوی ۰/۱ گرم بتامتازون دی سدیم فسفات میباشد.

2