

رها کلد روز® Raha Cold Day®

Acetaminophen / Phenylephrine HCl

استامینوفن/ فنیل افرین هیدروکلراید

ترکیبات: استامینوفن ۵۰۰ میلی گرم - فنیل افرین هیدروکلراید ۵ میلی گرم

شکل دارویی: قرص خط دار

دسته دارویی: ضد تب، ضد درد، ضد احتقان

موارد مصرف: تسکین موقت تب، درد، احتقان بینی و سینوس ناشی از سرماخوردگی، آلرژی، تب یونجه

هشدارها:

• پیش از مصرف این دارو در صورت حساسیت به استامینوفن یا فنیل افرین، بارداری یا قصد باردار شدن، شیردهی، ابتلا به اختلالات شدید کبدی یا کلیوی به پزشک اطلاع دهید. • پیش از شروع مصرف لیستی از کلیه داروها (بویژه سایر فرآورده های استامینوفن و مهارکننده های مونوآمین اکسیداز)، ویتامین ها و مکمل های مصرفی خود را در اختیار پزشک یا داروسازتان قرار دهید. • در صورت ابتلا به بیماری های قلبی عروقی از جمله بیماری ایسکمیک قلب و فشار خون بالا، گلوکوم و بالا بودن فشار داخل چشم، پرکاری تیروئید، دیابت، فلوپسم (اختلال G6PD)، آسم، هایپرتروفی پروستات، انسداد مجاری ادرار، انسداد روده و عفونت شدید پیش از شروع مصرف دارو به پزشک اطلاع دهید. در این افراد باید با احتیاط فراوان مصرف گردد. • از مصرف همزمان با سایر داروهای حاوی استامینوفن خودداری نمایید و از مصرف بیش از حداکثر دوز توصیه شده روزانه استامینوفن (۴ گرم در روز در بزرگسالان) خودداری نمایید. • از مصرف همزمان با داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز (MAOIs) (نظیر فنلژین، سلژلین، ترانیل سیپرومین، ایزوکربوکسازید) و تا ۱۴ روز پس از قطع مصرف آنها، از مصرف این دارو خودداری نمایید. • در سالمندان و افراد با اختلال عملکرد کبد با احتیاط فراوان مصرف گردد. • در صورت عدم بهبودی و یا تشدید درد و احتقان طی ۷ روز مصرف و یا عدم بهبود تب پس از ۳ روز مصرف، مصرف دارو را قطع نمایید و به پزشک اطلاع دهید. • در طول درمان با این دارو از مصرف الکل خودداری نمایید. • در صورت بروز حساسیت و واکنش های آنافیلاکتیک، مصرف دارو را قطع نمایید. • به محض بروز واکنش های شدید پوستی و مشاهده بثورات پوستی، مصرف دارو را قطع نمایید و به پزشک اطلاع دهید. • مصرف این دارو ممکن است سبب بروز گیجی گردد لذا ضمن مصرف از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید. • در صورت فراموش کردن یک نوبت دارو به محض به یادآوردن آن را مصرف کنید، ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی رسیده باشد آن را مصرف نکرده و مقدار مصرف بعدی را نیز دو برابر نکنید.

مقدار مصرف:

• در بزرگسالان دو عدد قرص هر ۴ الی ۶ ساعت مصرف شود.

• در کودکان و افراد زیر ۱۲ سال مصرف نشود.

از مصرف بیش از ۸ عدد قرص در طول ۲۴ ساعت خودداری نمایید.

(P.1)

دارو را طبق دستور پزشک مصرف نمایید و از مصرف بیش از مقدار تجویز شده خودداری نمایید.

دوران بارداری و شیردهی:

مصرف در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمیگردد مگر در صورت صلاحدید و تجویز پزشک متخصص.

عوارض جانبی:

عوارض شایع: افزایش فشار خون، تپش قلب، احتباس ادرار (بویژه در افراد با هایپرتروفی پروستات)، گیجی.

عوارض با شیوع کمتر و نادر: تهوع، استفراغ، ضعف، تنگی نفس، بی خوابی، اضطراب، سردرد، آریتمی، گلوکوم، واکنش های پوستی از جمله سندرم استیونز-جانسون، اختلالات خونی (لکوپنی، نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی).

تداخلات:

قبل از مصرف این دارو چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید به پزشک خود اطلاع دهید:

داروهای سمپاتومیمتیک، ضد افسردگی های سه حلقه ای (ایمپیرامین، کلومیپرامین، آمی تریپتیلین، نورتریپتیلین، تریعی پرامین)، داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز (فنلژین، سلژلین، ترانیل سیپرومین، ایزوکربوکسازید)، ارگوتامین، کلسیترامین، وارفارین، کلوزاپین، گاربازپین، آتوموکستین، آلفا-بلاکرها، فنتانیل، فنی توئین، لاموترژین، متوکلوپرامید، دومپریدون، داروهای کاهنده های فشار خون، دیگوسین.

موارد منع مصرف:

• در صورت حساسیت به استامینوفن، فنیل افرین یا هر یک از اجزای فرمولاسیون

• مصرف همزمان با سایر داروهای حاوی استامینوفن

• مصرف همزمان با داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز یا در طول ۱۴ روز پس از قطع مصرف مهارکننده های مونوآمین اکسیداز

• مصرف به مدت بیش از ۱۰ روز برای درد یا بیش از ۳ روز برای تب

شرایط نگهداری:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها قرص استامینوفن و فنیل افرین هیدروکلراید را به شکل قرص دو لایه به رنگ زرد و سفید و به صورت پلیسترهای ۱۰ عددی در جعبه عرضه می نماید.

(P.2)