

عوارض جانبی:

هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی، ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته ای نیز بشود، اگرچه همه ی این عوارض در یک فرد رخ نمی دهد اما در صورت هرکدام از آنها سریعاً با پزشک خود مشورت نمائید. به طور کلی لانزوپرازول در بین مهار کننده های پمپ پروتونی سازگاری خوب و عوارض کمی دارد.

عوارض زیر به ندرت گزارش شده اند:

اسهال ، دردهای شکمی ، تهوع ، یبوست و سر درد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

در کودکان و افراد کمتر از ۱۸ سال با دستور پزشک مصرف گردد. در بزرگسالان معمولاً روزانه یک کپسول (صبح ناشتا) و یا دو کپسول (صبح وعصر) مطابق با شرایط بیمار و دستور پزشک مصرف می گردد. کپسول با معده خالی به طور کامل و به همراه یک لیوان آب بلعیده شود. در افرادی که مشکل بلع دارند، می توان کپسول را باز کرده و در آب یا آب میوه ریخت. دارو را نیم تا یک ساعت قبل از غذا مصرف نمایید.

تداخلات دارویی:

استفاده همزمان این کپسول با مصرف داروهای ذیل تداخل دارد:

سوکرالفت، وویکونازول، داروهای ضدقارچ آزل، کلپیدوگرل، دیگوسین، ارلوتینیب، متوترکسات، مایکوفنولات، تاکرولیموس، تولترودین پیوسته رهاش، مهارکننده های تیروزین کیناز، مانند داساتینیب و نیلوتینیب، سالیسیلات، وارفارین و ریلپیویرین.

موارد منع مصرف:

حساسیت به لانزوپرازول یا هر یک از اجزای فرآورده

سابقه بیماری های کبدی و کلیوی

شرایط نگهداری:

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها لانزوپرازول را با نام تجاری رهازول[®] به صورت کپسول های ۳۰ میلی گرمی حاوی گرانول انتریک کت در پلیسترهای ۱۰ عددی عرضه می نماید.

www.rahapharm.com

CAP.LFT.RZL30/005.08

مستدوق پستی: ۵۶۷-۸۱۷۴۵

فکس: ۹۵۹-۳۶۵۴۰۳۱(+۹۸)

امشهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز، شهرک صنعتی صفه ، واحد ۱۱

تلفن: ۶۵۹-۳۶۵۴۰۳۱(+۹۸) ۸۵۹-۳۶۵۴۰۳۱(+۹۸)

Rahazol[®] 30 Lansoprazole

رهازل[®] ۳۰ لانزوپرازول

شکل دارویی: کپسول پیوسته رهش
دسته دارویی: مهارکننده پمپ پروتون (PPI)

موارد مصرف و آثار درمانی:

کاهش اسید معده، زخم معده، درمان هلیکوباکتر پیلوری مقاوم به درمان های مختلف، زخم دوازدهه، سندروم زولینگر-الیسون، بیماری های مری، ازوفازیت فرسایشی (Erosive Esophagitis)، سوزش سردل، رفلاکس (GERD: Gastroesophageal Reflex Disease)، درمان و پیشگیری از زخم معده بدلیل مصرف مسکن های غیر استروئیدی (NSAID)، کاهش ریسک خونریزی معده در بیمارانی که داروهای ضد پلاکت خون مصرف می کنند.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید. قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:

۱- در صورت سابقه حساسیت به این دارو

۲- در صورت مصرف هرگونه داروی دیگر

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

در گروه B از رده بندی FDA قرار دارد. به نظر می رسد برای زنان باردار مشکلی بوجود نمی آورد، ولی با این حال مصرف فقط با تجویز پزشک صورت گیرد. به دلیل عدم مطالعات کافی روی احتمال ترشح متابولیت های لانزوپرازول در شیر مادر و خطرانی که نوزاد را تهدید می کند، مصرف این دارو در دوران شیردهی مگر با صلاحدید پزشک معالج توصیه نمی شود.

هشدارها:

• از مصرف بی رویه بدون تجویز پزشک خودداری شود. • از جویدن، خرد کردن یا باز کردن کپسول خودداری شود. • داروهای گروه PPI در مصرف طولانی مدت، باعث افزایش رشد باکتری های داخل دستگاه گوارش می شوند و احتمال عفونت افزایش می یابد. مصرف این دارو ممکن است علائم تومورهای گوارشی را بپوشاند و تشخیص را به تاخیر بیندازد. • مواردی از شرایط حاد هاپیومنیومی پس از مصرف داروهای گروه PPI گزارش شده است. • در بیماران با نارسایی حاد کبد، باید با احتیاط مصرف گردد. • مصرف طولانی مدت ممکن است باعث کاهش جذب ویتامین B۱۲ شود. • مصرف طولانی مدت (بیش از یک سال) توصیه نمی شود. • تا ۲ ساعت قبل و بعد از مصرف این دارو از مصرف داروهایی که جهت درمان سوء هاضمه بکار می روند، خودداری نمائید.

www.rahapharm.com

CAP.LFT.RZL30/005.08

مستدوق پستی: ۵۶۷-۸۱۷۴۵

فکس: ۹۵۹-۳۶۵۴۰۳۱(+۹۸)

امشهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز، شهرک صنعتی صفه ، واحد ۱۱

تلفن: ۶۵۹-۳۶۵۴۰۳۱(+۹۸) ۸۵۹-۳۶۵۴۰۳۱(+۹۸)