



مقدار مصرف:

• رینیت آلرژیک:

کودکان بالای ۱۲ سال: دو پاف در هر سوراخ بینی، یک بار در روز (دوز دریافتی روزانه معادل ۲۰۰ میکروگرم می باشد).
پس از کنترل علائم دوز معادل یک پاف در هر سوراخ بینی می باشد.

کودکان ۲ تا ۱۱ سال: یک پاف در هر سوراخ بینی، یک بار در روز (دوز دریافتی روزانه معادل ۱۰۰ میکروگرم می باشد).
ایمینی و اثر دارو در کودکان کمتر از ۲ سال، ثابت نشده است.


• پیشگیری از رینیت آلرژیک فصلی:

کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان: دو پاف در هر سوراخ بینی، یک بار در روز و برای پیشگیری، ۲ تا ۴ هفته قبل از شروع احتمالی آلرژی
• درمان پولیپ بینی:

بزرگسالان بالای ۱۸ سال: دو پاف در هر سوراخ بینی، یک بار در روز (در صورت عدم کنترل علائم پس از ۵ تا ۶ هفته، دوز دو برابر می گردد).
ایمینی و اثر دارو در افراد کمتر از ۱۸ سال، ثابت نشده است.

نحوه مصرف:

قبل از استفاده، اسپری را خوب تکان دهید. سر را کمی به جلو خم نمائید، سر اسپری را داخل یکی از سوراخ های بینی قرار دهید و با دست، سوراخ دیگر بینی را مسدود نمائید. در حالیکه از بینی و با دهان بسته نفس می کشید، اسپری را تا انتها فشار دهید. این عمل را برای سوراخ دیگر بینی تکرار نمائید. بعد از دو بار مصرف، درپوش اسپری را در جای خود قرار دهید. دارو را بیش از مقدار توصیه شده مصرف نمائید.



عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب، ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته ای شود، گرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد اما در صورت بروز هرکدام از آن ها با پزشک خود مشورت نمائید:

• علائم با شیوع بیشتر: سر درد، خونریزی از بینی، التهاب گلو، حساسیت بینی، سوزش، زخم و التهاب بینی، عطسه.
• علائم نادر: واکنش افزایش حساسیت، آنژیو ادم، برنکو اسپاسم، اختلال تنفس، گلوکوم، آب مروارید، اختلال در حس چشایی و بویایی.

شرایط نگهداری:

دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نموده و از یخ زدگی محافظت نمائید. پس از هر بار مصرف درپوش ظرف را محکم ببندید. یک ماه پس از باز شدن درپوش ظرف، باقیمانده دارو را دور بریزید. دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمائید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها اسپری مومتازون فوروات را با نام تجاری راولیزون® در ظروف پلی اتیلنی، همراه با برگه راهنما و درون جعبه بسته بندی و به بازار عرضه می نماید. هر پاف حاوی ۵۰ میکروگرم ماده موثره می باشد.



Ravison® 0.05%
Mometasone Furoate

راویزون ۰/۰۵٪ درصد
مومتازون فوروات

شکل دارویی: اسپری بینی (سوسپانسیون) حاوی مومتازون فوروات ۰/۰۵ درصد
دسته دارویی: ضد التهاب استروئیدی

موارد مصرف و آثار درمانی:

• پیشگیری و درمان علائم رینیت آلرژیک فصلی و دائمی
• کاهش خارش و آبریزش بینی، عطسه، تب یونجه، پولیپ بینی، جلوگیری از بازگشت پولیپ بینی بعد از عمل جراحی.

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمائید. قبل از مصرف، در صورت داشتن سابقه حساسیت به این دارو و یا مواد جانبی آن، ابتلاء به بیماری های مختلف یا مصرف سایر داروها پزشک خود را مطلع سازید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این اسپری بینی، در رده C از طبقه بندی FDA قرار دارد و در دوران بارداری، فقط با نظر پزشک متخصص و با آگاهی از منافع و مضرات دارو مصرف شود. در دوران شیردهی بهتر است با احتیاط و با مشورت پزشک مصرف شود.

هشدارها:

• در زمان واکنش اسپریون به علت کاهش سطح ایمینی، مصرف داروهای کورتیکواستروئید بینی با احتیاط بیشتری صورت پذیرد، در زمان مصرف این دارو، از تزریق واکسن پرهیز نمائید مگر در صورت صلاحدید پزشک، در صورت ایجاد علائم عفونت بینی، حلق یا سینوس ها و بدتر شدن علائم، پزشک را مطلع سازید. برای جلوگیری از آلوده شدن دارو، از تماس نوک اسپری با سطوح خارجی خودداری نمائید. قبل از مصرف آخرین دوزهای دارو طبق دستور پزشک، اسپری جدید تهیه نمائید، زیرا ممکن است آخرین پاف های اسپری حاوی مقدار کافی از دارو نباشد. چنانچه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کرده اید. به محض یادآوری، آن را مصرف نمائید، اما اگر زمان مصرف نوبت بعدی دارو فرا رسیده است، از مصرف نوبت فراموش شده چشم پوشی نموده و مقدار مصرف بعدی را نیز دو برابر نکنید. در صورت مصرف طولانی مدت در کودکان و یا مصرف دوزهای بالاتر از حد معمول، رشد کودکان باید زیر نظر گرفته شود. در صورت مصرف سایر داروها به ویژه داروهای حاوی ادرین، فنوباریتال و ریفامپین، به پزشک خود برای بررسی تداخلات دارویی اطلاع دهید. در بیماران دارای عفونت سل فعال، با احتیاط مصرف گردد. در بیماران دارای نقص سیستم ایمنی، مصرف کورتیکو استروئیدها ریسک ابتلاء به بعضی از عفونت ها را افزایش می دهد.

موارد منع مصرف دارو:

• این دارو در صورت سابقه حساسیت به مومتازون و یا سایر اجزاء فرآورده و همچنین در صورت سوراخ سپتوم بینی، وجود عفونت کنترل نشده قارچی، باکتریائی، ویروسی از جمله هرپس منع مصرف دارد.
• به دلیل معانعت کورتیکواستروئیدها از بهبود زخم، در بیماران با عمل جراحی اخیر بینی و ضربه استفاده نگردد.