

ت (مسمومیت دارویی :

در غلظتهای درمانی معمولاً عارضه ای مشاهده نمی شود.
در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد ، فرد مسموم را سریعاً به بخش مسمومین بیمارستان منتقل کنید.

ج (شرایط نگهداری دارو :

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت کنید.
دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

چ (پسته بندی :

شرکت داروسازی رها سیپروهیتادین ، اسید آمینه و ویتامین های گروه ب را با نام تجاری راسیپ® و به شکل شربت خوراکی در ظروف از جنس PET ، ۲۰۰ میلی لیتری به همراه پیمانه و بروشور درون جعبه عرضه می کند.

Racip®

راسیپ®

شکل دارویی : شربت خوراکی

ترکیبات (در هر ۵ میلی لیتر):

سیپروهیتادین هیدروکلراید ۲ میلی گرم- لوکارنیتین ۱۲۲/۳ میلی گرم- لیزین هیدروکلراید ۱۲۰ میلی گرم- ویتامین B1 ۰/۵ میلی گرم ویتامین B6 ۱ میلی گرم- ویتامین B12 ۲۵ میکروگرم.

موارد مصرف و آثار درمانی :

درمان بی اشتهائی در کودکان و بالغین مبتلا به اختلالات فیزیولوژیک عاطفی یا ارگانیک ، بی اشتهائی متعاقب بیماری های عفونی ، سوء تغذیه ، تأخیر در رشد ، بی اشتهائی در اطفال ، استفراغ های دائمی ، ناپایداری های عاطفی هنگامی که همراه با علائم بی اشتهائی باشد ، بی اشتهائی در بزرگسالان ، لاغری های مربوط به اختلالات مزاجی ، کمک به تولید انرژی و کمک به پیشگیری و درمان تبخال (به دلیل وجود لیزین).

الف) راهنمایی های عمومی :

- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
- ❖ در صورت سابقه حساسیت به هریک از اجزاء تشکیل دهنده فرمول ، آنتی هیستامین ها و یا هر ماده غذایی دیگر.
- ❖ در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر گلوکوم ، سابقه احتباس ادراری
- ❖ در نوزادان تازه متولد شده

ب) مصرف در دوران بارداری و شیر دهی :

مصرف دارو در دوران بارداری و شیردهی با صلاحدید پزشک صورت می گیرد (گروه B).

پ) مقدار و نحوه مصرف دارو :

کودکان ۱ تا ۷ سال : ۵ میلی لیتر ، دو بار در روز قبل از غذا.

کودکان بالای ۷ سال : ۱۰ میلی لیتر ، دو بار در روز قبل از غذا.

بزرگسالان : ۱۵ میلی لیتر ، سه بار در روز قبل از غذا.

ت) عوارض جانبی:

شایعترین عارضه خواب آلودگی می باشد.

2

1