

ج (عوارض جانبی):

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. از جمله واکنشهای حساسیتی نظیر آسم، آلرژی پوستی و کهیر، نیش قلب، گیجی، توهم، تشنج، عصبانیت، وز وز گوش، افسردگی، اختلالات دستگاه عصبی، تهوع، استفراغ، اسهال و درد معده.

چ (بسته بندی):

شرکت داروسازی رها ترکیب استامینوفن / ایبوپروفن / کافئین را با نام تجاری رهافن® به صورت کپسول در بلیستر و درون جعبه به همراه برگه راهنما عرضه میکند.

Rahafen®

Acetaminophen / Ibuprofen / Caffeine

رهافن®

استامینوفن / ایبوپروفن / کافئین

شکل دارویی: کپسول

دسته دارویی: مسکن

موارد مصرف و آثار درمانی: ضد درد، موثر در درمان سردرد، خصوصاً سردرد های میگرنی

ترکیبات: هر کپسول حاوی ۲۲۵ میلی گرم استامینوفن، ۲۰۰ میلی گرم ایبوپروفن و ۴۰ میلی گرم کافئین میباشد.

الف (مصرف در دوران بارداری و شیر دهی):

استفاده از این دارو در دوران بارداری و شیردهی مجاز نمی باشد و مصرف آن تنها با تجویز پزشک متخصص در صورت ضرورت و ارزیابی منافع و مضرات آن امکان پذیر است .

ب (هشدارها):

- ❖ مصرف این دارو در کودکان کمتر از ۱۲ سال مجاز نمیشود.
- ❖ از مصرف سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی با ترکیب مشابه این دارو (حاوی استامینوفن و ایبوپروفن) خودداری شود.
- ❖ این دارو ممکن است سبب سرگیجه، خواب آلودگی و اختلال در بینایی گردد. لذا در حین مصرف این دارو از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری شود.
- ❖ از مصرف ترکیبات گراتینی نظیر تئوفیلین همراه با این دارو که باعث افزایش ترشح اسید معده و زخم معده میشود حتی المقدور اجتناب شود.
- ❖ در صورت نیاز به اعمال جراحی، بدلیل احتمال خونریزی باید بیمار مصرف دارو را قطع نموده و با پزشک خود مشورت نماید.
- ❖ جهت کاهش تحریکات گوارشی دارو همراه با غذا یا آنتی اسید ها (حاوی منیزیم و آلومینیوم) مصرف شود.
- ❖ از مصرف مقادیر زیاد چای و قهوه همراه با این دارو خودداری شود .

پ (مقدار و نحوه مصرف دارو):

- ❖ مقدار مصرف این دارو برحسب تجویز پزشک معالج تعیین میشود. دوز مصرف معمول دارو برای بزرگسالان و کودکان بالاتر از ۱۲ سال هر ۶-۴ ساعت ۱ عدد می باشد.
- ❖ هر وعده دارو همراه یا بعد از غذا و همراه با یک لیوان پر آب میل شود.

ت (مسمومیت دارویی):

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار تعیین شده بلافاصله به پزشک یا بیمارستان مسمومین مراجعه شود.

ث (شرایط نگهداری دارو):

دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود .

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.