

Rahamet® 500 mg/ 5ml Metformin

رها مت® ۵۰۰ میلی گرم در ۵ میلی لیتر
متفورمین

شکل دارویی: محلول خوراکی
دسته دارویی: ضد دیابت (بی گوانید)

موارد مصرف و آثار درمانی:

- دیابت نوع ۲، درمان افزایش وزن القا شده توسط داروهای آنتی سایکوتیک (off-label use)، سندرم تخمدان پلی کیستیک (off-label use).
- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنمایی های عمومی:

- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
 ۱. در صورت حساسیت به این دارو یا هر نوع دارو یا ماده محافظ و ماده رنگین
 ۲. در صورت مصرف همزمان داروهایی از قبیل سایمتیدین، فورزماید، آمیلوراید، نیفیدپین، دیگوکسین، مورفین، پروکلین آمید، کینیدین، رانیتیدین، تریامتین اچ، وانکومایسین، تریمتوپریم و الکل.
 ۳. در صورت ابتلا به بیماری های کبدی شدید یا مزمن، پرکاری یا کم کاری تیروئید، سابقه اسیدوز لاکتیک، نارسایی کلیوی، کمبود اکسیژن، اسهال، انسداد روده، تهوع، سوختگی شدید، کمای دیابتیک، عفونت شدید، جراحی سنگین، مصرف داروهای حاوی ید برای تصویر برداری و آنژیوگرافی.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

- مصرف دارو در دوران بارداری با نظر پزشک باشد. (گروه B). این دارو در شیر ترشح می شود. در شیردهی فقط در صورت تجویز پزشک مصرف گردد.

موارد احتیاط و هشدارها:

۱. دارو را طبق دستور پزشک مصرف کنید و در دوره درمان بطور منظم تحت نظر پزشک قرار گیرید.
۲. برای کنترل قند خون خود مرتب تحت نظر پزشک قرار گیرید.
۳. در مورد میزان فعالیت های بدنی و رژیم غذایی خود با پزشک مشورت کنید.
۴. از پزشک خود آموزش ببینید که در مواقع اضطراری چه اقدامی انجام دهید .
۵. قبل از انجام جراحی و یا آزمایشات پزشکی که نیاز به مصرف داروهای "کنتراست مدیا" برای عکسبرداری میباشد، مصرف متفورمین را قطع نموده و ۴۸ ساعت بعد از آزمایش یا جراحی در صورت نرمال بودن عملکرد کلیه مجددا مصرف دارو را با نظر پزشک شروع نمایید.
۶. در صورت بروز علائم اسهال، تنفس سریع و سطحی، درد عضلانی شدید، دل درد، خستگی ، ضعف و خواب آلودگی، قند خون را کنترل کرده و به پزشک مراجعه کنید. در صورت استقرار به پزشک اطلاع دهید.
۷. در مورد علائم افت قند خون و افزایش قند خون و راه های مقابله با آن در صورت بروز از مراکز مربوطه آموزش ببینید.
۸. در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو به محض به یاد آوردن مقدار فراموش شده را مصرف کنید ولی اگر زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد آن را مصرف نکرده و مقدار مصرف بعدی را نیز دو برابر نکنید.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می کند. به منظور پیشگیری از عوارض گوارشی این دارو باید همراه یا بعد از غذا خورده شود. از پیمانه داخل جعبه برای اندازه گیری مقدار دارو استفاده نمایید و پس از هر بار مصرف آن را بشویید.

عوارض جانبی:

این دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته ای نیز بشود. اگر چه در اغلب بیماران عارضه چندانی بروز نکرده و یا عوارض جزئی با ادامه درمان و تطبیق بدن با دارو برطرف می شود. در صورت بروز بعضی از عوارض و ادامه یا تشدید آن ها با پزشک (یا داروساز) مشورت کنید. کم خونی، ضعف، خستگی، بی اشتها، تاری دید، سر درد، تهوع، تپش قلب، اسهال، درد عضلات، تنفس کوتاه و سطحی، مزه فلزی در دهان، کاهش وزن.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد تعیین شده و در صورتی که مدت زیادی از خوردن دارو نگذشته باشد بیمار را وادار به استفراغ نموده و سریعاً به بیمارستان منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کرده و از یخ زدگی محافظت کنید.
- دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.
- دو ماه پس از اولین مرتبه باز کردن بطری، باقیمانده دارو را دور بریزید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها محلول خوراکی متفورمین را با نام تجاری رها مت® در جعبه به همراه برگه راهنما بسته بندی و به بازار عرضه می کند. هر ۵ میلی لیتر محلول خوراکی حاوی ۵۰۰ میلی گرم متفورمین هیدروکلراید می باشد.