

Ravison® 0.1% Mometasone Furoate

راویزون® ۰/۱ درصد مومتازون فوروآت

شکل دارویی: کرم موضعی
دسته درمانی: ضد التهاب استروئیدی
موارد مصرف و آثار درمانی:
درمان التهاب های شدید پوستی و خارش ناشی از بیماری های از جمله اگزمای مقاوم به کورتیکو استروئیدهای ضعیف تر، پسوریازیس (به استثنای پسوریازیس با پلاک منتشر و درماتیت آتوپیک).

هشدارها و موارد احتیاط:

- ❖ در صورت ایجاد تحریک یا حساسیت، دارو باید قطع گردد و درمان مناسب جایگزین گردد.
- ❖ در صورت گسترش یک عفونت، از یک داروی ضد قارچ یا ضد باکتری استفاده گردد و در صورت عدم پاسخ مناسب، کورتیکو استروئید تا کنترل عفونت، قطع گردد.
- ❖ جذب سیستمیک کورتیکو استروئیدهای موضعی ممکن است محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال (HPA) را به طور برگشت پذیر مهار کند. ممکن است در برخی از بیماران سندروم کوشینگ، هیپرگلیسمی و گلوکزاورری ایجاد شود. بیمارانی که یک استروئید موضعی را در ناحیه وسیعی از بدن و یا پانسمان بسته استفاده می نمایند، در طول درمان باید از نظر مهار محور HPA کنترل گردند. این عوارض به ویژه در کودکان و نوزادان ایجاد می گردد.
- ❖ ایمنی و اثر بخشی این دارو در کودکان زیر ۲ سال اثبات نشده و مصرف آن توصیه نمی گردد.
- ❖ سمیت سیستمیک دارو بیشتر با مصرف طولانی مدت بر روی پوست آسیب دیده، چین خوردگی های پوست و پانسمان بسته اتفاق می افتد. در مصرف کودکان و یا بر روی صورت، پانسمان نباید انجام گردد.
- ❖ از مصرف طولانی مدت دارو در همه بیماران صرف نظر از سن، خودداری گردد.
- ❖ استروئیدهای موضعی ممکن است در پسوریازیس خطرناک باشند.
- ❖ در صورت مصرف طولانی مدت دارو، از قطع مصرف ناگهانی خودداری کنید. در این صورت ممکن است درماتیت به همراه قرمزی، خارش و سوزش ایجاد گردد. از این پدیده می توان با قطع تدریجی مصرف دارو، پیشگیری کرد.
- ❖ این دارو برای مصرف چشمی و استفاده بر روی پلک نمی باشد.
- ❖ مصرف کورتیکو استروئیدهای موضعی در کودکان یا بر روی صورت، باید با حداقل میزان موثر بوده و طول دوره درمان نباید بیش از ۵ روز باشد.

مصرف در دوران بارداری و شیر دهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری فقط با تجویز پزشک و در صورت بیشتر بودن منافع دارو نسبت به ریسک آن، انجام گردد و از مصرف طولانی مدت دارو و یا مصرف بر روی سطح وسیعی از پوست، خودداری گردد. شواهد کافی از ایمنی مصرف دارو در دوران بارداری در دست نمی باشد.
در دوران شیردهی، مصرف دارو فقط پس از مقایسه منافع و مضرات دارو انجام گردد. در صورت نیاز به مصرف طولانی و یا دوزهای بالای دارو، شیردهی متوقف گردد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

بالغین و کودکان بالای ۲ سال: دارو را روزی یکبار به محل مورد نظر (پوست) بمالید.

عوارض جانبی:

- ❖ عوارض موضعی: خشکی پوست، التهاب، درماتیت، درماتیت اطراف دهان، عرق سوز شدن پوست، تلائزکتازی
- ❖ مصرف کورتیکو استروئید به صورت طولانی مدت، ممکن است رشد کودکان را تحت تاثیر قرار دهد.
- ❖ عوارض نادر: عفونت، فولیکولیت فرونگل، پارستزی، احساس سوزش، درماتیت تماسی، هیپوپیگمانتاسیون (بی رنگ شدن) پوست، هیپرتریگوز، استریای پوست، آتروفی پوست، خارش

موارد منع مصرف:

روازسه صورت، آکنه و لگاریس، آتروفی پوست، درماتیت اطراف دهان، خارش زئیتال، بثورات پوشک، عفونت های باکتریایی، ویروسی، قارچی و انگلی، واریسلا، تویرکلوزیس (سل)، سیفلیس یا واکش های پس از واکسیناسیون، استفاده بر روی زخم، حساسیت به مومتازون و یا کورتیکو استروئیدهای دیگر.

شرایط نگهداری دارو:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایند.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها مومتازون فوروآت را با نام تجاری راویزون® به شکل کرم موضعی در تیوب تهیه و درون جعبه به همراه بروشور بسته بندی و به بازار عرضه می نماید.