

راویت - بی[®]

ویتامین ب_۱ / ب_۶ / ب_{۱۲}

Vitamin B₁/B₆/B₁₂

شکل دارویی: آمپول تزریقی ۳ میلی لیتری

ترکیبات: هر ۳ میلی لیتر آمپول حاوی ویتامین B₁ ۱۰۰ میلی گرم - ویتامین B₆ ۱۰۰ میلی گرم - ویتامین B₁₂ ۱۰۰۰ میکروگرم می باشد.

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.
- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید:

در صورت سابقه حساسیت به تیامین، سیانوکوبالامین، هیدروکسی کوبالامین و پیریدوکسین و یا سابقه بیماری لیبر (آتروفی عصب بینایی)

- به علت وجود بنزیل الکل این دارو در کودکان زیر ۲ سال منع مصرف دارد.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف دارو در دوران بارداری و شیردهی فقط با نظر پزشک متخصص مجاز می باشد.

هشدار:

در طول مصرف این دارو به نکات زیر توجه نمایید:

- دارو را در طی دوره درمان خودسرانه قطع نکنید.
- دارو را بیش از مقدار و مدت توصیه شده توسط پزشک، مصرف نکنید.
- در صورتیکه در زمان درمان توسط این دارو، داروی ضد پارکینسون نظیر لودوپا مصرف می نمائید به پزشک خود اطلاع دهید. مصرف همزمان این داروها باعث کاهش اثر لودوپا می شود. همچنین این دارو بطور همزمان با داروهای نظیر ایزونیازید، پنی سیلامین، هیدرالازین، سیکلوسرین، فوروزماید، فلوئوروآراسیل، کلرامفنیکل، فنی توتین و ضدبارداری های خوراکی تداخل دارد.
- در صورتیکه طی چند روز درمان علائم بهبودی مشاهده نشد به پزشک مراجعه کنید.
- در طول دوره درمان تست های خونی هر ۳ تا ۶ ماه انجام شوند.
- اگر یک نوبت تزریق فراموش شد، اهمیتی ندارد، زیرا مدت زمان طولانی لازم است تا این ویتامین ها از بدن تخلیه شوند.
- هیپوکالمی و مرگ ناگهانی ممکن است در آنمی مگالو بلاستیک شدید، رخ دهد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف این دارو را پزشک تعیین می کند.

تزریق دارو فقط به صورت عضلانی انجام شود. از تزریق وریدی دارو بپرهیزید.

(P.1)

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز هر یک از عوارض ذیل با پزشک مشورت نمائید:

- با افزایش دوز دارو عوارضی مانند نوروپاتی محیطی شدید، عدم تعادل موقع راه رفتن، بی حسی در دستها و پاها
- عوارض جانبی نادر شامل: واکنشهای آنافیلاکتیک، سرفه، مشکل در بلع، کهیر، خارش پوستی، تورم در صورت و لبها و اشکال در تنفس، واکنش در محل تزریق، آکنه، تاکیکاردی
- در صورت ادامه عوارضی مانند اسهال و خارش پوستی

شرایط نگهداری دارو:

دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و درون جعبه خود نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها آمپول ۳ میلی لیتری ب_۱ / ب_۶ / ب_{۱۲} را با نام تجاری راویت-بی[®]، درون جعبه ۱۰ عددی و به همراه برگه راهنما عرضه می نماید.

(P.2)