

Raxum[®] 40

Esomeprazole

راکسوم[®] ۴۰

اس امپرازول

شکل دارویی: قرص انتریک کتود ۴۰ میلی گرمی

دسته دارویی: مهار کننده ترشح پمپ پروتونی، مهار کننده ترشح اسید معده، ضد زخم معده.

موارد مصرف:

داروها موارد مصرف مختلفی دارند، ممکن است هدف پزشک شما در تجویز این دارو در این بروشور ذکر نشده باشد.

به طور عمومی موارد مصرف این دارو شامل موارد زیر می باشد:

اس امپرازول ایزومر **S** (چپ گرد) از امپرازول (مهار کننده پمپ پروتونی معده) می باشد و به طور مشابه در درمان بیسماری زخم معده و رفلاکس گوارشی کاربرد دارد.

این دارو در سندرم زولینگر - الیسون و زخم معده شدید همراه با خونریزی، نیز تجویز می شود و برای ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری به صورت ترکیبی در کنار کلاریترومایسین، آموکسی سیلین یا مترونیدازول، و همچنین در کاهش ریسک زخم معده در اثر مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، نیز تجویز می شود.

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید. قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید:

۱- در صورت سابقه حساسیت به این دارو.

۲- در صورت بروز سوء هاضمه، اسهال و کپیر در طی درمان.

مصرف در دوران بارداری و شیر دهی:

این دارو در گروه **C**، از طبقه بندی **FDA** قرار دارد، مطالعات کافی روی انسان انجام نشده است. لذا مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک و پس از مقایسه منافع دارو نسبت به مضرات آن، انجام گردد.

هشدارها:

- این دارو باید در بیماران مبتلا یا دارای سابقه ابتلا به بیماری مزمن کبدی با احتیاط مصرف گردد.
- مهار کننده های پمپ های پروتونی به دلیل کاهش اسید معده، باعث کاهش جذب بسیاری از داروهای دیگر می شوند. برای جذب بهتر و موثر داروهای دیگر با دکتر داروساز خود مشورت کنید.
- مصرف این دارو ممکن است، احتمال ابتلا به عفونت های گوارشی مانند سالمونلا و کامپیلوباکتر را افزایش دهد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معالج تعیین می نماید، مقدار معمول مصرف این دارو به شرح زیر می باشد:

- ❖ کودکان ۱۲ تا ۱۷ سال روزانه یک قرص، برای درمان کوتاه مدت تا حداکثر ۸ هفته.
- ❖ بزرگسالان ۱ قرص برای مدت ۴ تا ۸ هفته (در درمان سندرم زولینگر-الیسون با توجه به شرایط بیماری دوز دارو می تواند تا ۱۶۰ میلی گرم در روز افزایش یابد).
- ❖ دارو را حداقل یک ساعت قبل از وعده غذایی مصرف نمایید تا اثر بخشی بهتری داشته باشد.

عوارض جانبی:

عوارض جانبی خاصی از مصرف این دارو گزارش نشده است، ولی هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب، ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته ای شود، گرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد ولی در صورت بروز هر کدام از آنها با پزشک خود مشورت نمایید:

عوارض شایع: سردرد، درد شکمی، یبوست، اسهال، نفخ، تهوع و استفراغ، پولیپ غدد فاندیک.

عوارض غیر شایع: ادم محیطی، بی خوابی، گیجی، خواب آلودگی، بی حسی، سرگیجه، خشکی دهان، افزایش آنزیم کبدی، درمانیت، خارش، راش، کپیر، شکستگی استخوان ران، مچ دست و ستون فقرات.

عوارض با احتمال بسیار کم: لوکوپنی، ترومبوسیتوپنی، آگرانولوسیتوز، پان سیتهونی، واکنش های حساسیتی، هایپوناترمی، هایپو منیزمی، هایپو کالمی، بی قراری، افسردگی، توهم، تغییر در طعم دهان، تاری دید، برونکواسپاسم، التهاب معده، کاندیدیازیس گوارشی، کوکلیت، هیپاتیت، نارسایی کبدی، انسفالوپاتی (در بیماران با سابقه قبلی بیماری کبدی)، آلپوسی، حساسیت به نور، آرترالژی، میالژی، اریتما، استیون-جانسون، نکروز اپیدرمال توکسیک، لوپوس اریتماتوز، ضعف عضلانی، زینکوماستی، افزایش تعریق، بی حالی.

مسمومیت دارویی:

احتمال مسمومیت با این دارو بسیار کم است. در موارد نادر بیمار را به اورژانس مسمومین منتقل کنید.

شرایط نگهداری دارو:

این دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها، قرص اس امپرازول ۴۰ میلی گرمی انتریک کتود را با نام تجاری راکسوم[®] در بلیستر و درون جعبه به همراه برگه راهنما به بازار عرضه می کند.