



شرکت داروسازی رها
RAHAPHARMA.CO.



(البته در مطالعات انجام شده، تا دوز ۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز به خوبی تحمل شده است).

• دردهای نوروپاتی محیطی:

دوز دارو براساس شرایط بیمار و میزان پاسخ دهی به درمان تعیین می گردد. حداکثر دوز دارو در این مورد ۳۶۰۰ میلی گرم در روز است. این دارو را می توانید با یا بدون غذا مصرف نمائید. دارو را به موقع مصرف نمائید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این دارو در رده C بارداری از طبقه بندی FDA قرار دارد و در شیر مادر ترشح می شود لذا مصرف آن در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی گردد و تنها در صورت صلاحدید پزشک متخصص مجاز می باشد.

عوارض جانبی:

هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز گردد، اگر چه همه این عوارض در یک فرد رخ نمی دهد اما در صورت بروز هر کدام از این عوارض به پزشک خود اطلاع دهید:
آتاکسی، نیستائگموس، اختلالات نوروسایکوتیک، ضعف و اختلالات فکری در کودکان، افسردگی، اختلال حافظه، آتروادم، لکوپنی، اختلال در تفکر، سرگیجه، اسهال، خستگی، درد عضلانی و اختلال بینایی.
عوارض جانبی سیرنتین به طور معمول ضعیف تا متوسط است و با قطع دارو برطرف می گردد.

موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت به گاباپنتین یا هر یک از اجزای فرمولاسیون دارو

تداخلات:

• مصرف همزمان با اسپری بینی آلرستین، برهمپیدول، اورفنادین، اکسومعازین، پارالهدید و تالدومید اکیدا خودداری نمائید.
• مصرف همزمان با داروهای اپیوتیدی و داروهای آرامبخش، احتمال دپرسیون تنفسی و خواب آلودگی را خصوصا در سالمندان افزایش می دهد.
• مصرف همزمان با داروهای آنتی اسید حاوی آلومینیوم و منیزیم، فراهم زیستی گاباپنتین را کاهش می دهد لذا توصیه می شود ۲ ساعت قبل از آنتی اسیدها مصرف گردد.

مسمومیت:

در صورت مصرف بیش از مقدار تجویز شده، بیمار را وادار به استفراغ کرده و سریعاً به بیمارستان منتقل نمائید.

شرایط نگهداری:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمائید.
دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمائید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها گاباپنتین را به صورت کپسول ۱۰۰ میلی گرمی با نام تجاری سیرنتین® ۱۰۰ در پلیستر و درون جعبه عرضه می نماید.

www.rahapharm.com

CAP.LFT.SRN(100)06

صندوق پستی: ۵۶۷-۸۱۷۴۵

فکس: ۰۹۵۹-۳۶۵۴۰۳۱(+۹۸)

اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی سفه ، واحد ۱۱

تلفن: ۰۶۵۹-۳۶۵۴۰۳۱(+۹۸) ۰۹۵۹-۳۶۵۴۰۳۱(+۹۸)



شرکت داروسازی رها
RAHAPHARMA.CO.



Sirentin® 100

Gabapentin

سیرنتین® ۱۰۰

گاباپنتین

شکل دارویی: کپسول ۱۰۰ میلی گرمی

دسته دارویی: ضد تشنج

موارد مصرف: درمان تشنج، درمان دردهای عصبی (نوروپاتی)

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید:

- در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو، غذا، ماده رنگی یا محافظ
- در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر نارسایی کلیوی
- در صورت مصرف هرگونه دارو از جمله: آنتی اسید، مورفین، سایر داروهای ضد تشنج و اعصاب

هشدارها:

- مصرف این دارو در کودکان کمتر از ۳ سال توصیه نمی شود.
- دوز مصرف دارو در بیماران سالمند و افرادی که دچار نارسایی کلیوی هستند الزاماً تعدیل شود.
- از قطع مصرف ناگهانی خودداری نمائید و در هنگام قطع مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمائید زیرا در صورت قطع ناگهانی، احتمال بروز تشنج افزایش می یابد.
- این دارو ممکن است سبب گیجی، سرگیجه و خواب آلودگی شود؛ لذا در هنگام مصرف از رانندگی و انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری و دقت دارند خودداری نمائید.
- برای پیشرفت درمان تحت نظر پزشک خود باشید.
- در صورتیکه نیاز باشد دارو را در آب حل کرده و میل کنید، هر دوز از دارو را در همان زمان مصرف در آب حل کنید و از نگهداری داروی حل شده برای دفعات بعدی خودداری نمائید.
- چنانچه دارو به صورت ۳ بار در روز مصرف می گردد، حداکثر فاصله بین دو دوز دارو بیش از ۱۲ ساعت نباشد.
- در صورت نیاز به افزایش دوز، به منظور پرهیز از بروز عوارض جانبی سیستم عصبی، دوز دارو باید حتماً به تدریج و به صورت ۳۰۰ میلی گرم در روز افزایش یابد.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف دارو توسط پزشک و براساس شرایط بیمار تعیین می گردد اما بطور معمول میزان مصرف این دارو به شرح زیر می باشد:

تشنج:

بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال: دوز موثر این دارو ۹۰۰ تا ۳۶۰۰ میلی گرم در روز می باشد.

کودکان ۶ تا ۱۲ سال: دوز شروع ۱۰-۱۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز و دوز موثر آن ۲۵-۳۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز می باشد.

www.rahapharm.com

CAP.LFT.SRN(100)05

صندوق پستی: ۵۶۷-۸۱۷۴۵

فکس: ۰۹۵۹-۳۶۵۴۰۳۱(+۹۸)

اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی سفه ، واحد ۱۱

تلفن: ۰۶۵۹-۳۶۵۴۰۳۱(+۹۸) ۰۹۵۹-۳۶۵۴۰۳۱(+۹۸)