



• از مصرف این فرآورده همراه با شیر، مکمل های کلسیم و آنتی اسیدهای حاوی کلسیم خودداری نماید. • این فرآورده در افراد تحت درمان با داروهای ضد انتقادات خون (آسپرین، وارفارین، هپارین، انوکسپارین، دالتپارین، کلوبیدوگرل) باید حتماً با مشورت و تحت نظر پزشک مصرف گردد. • در صورت مصرف داروهایی هانند دیورتیک ها، داروهای قلبی یا ضد فشار خون، تریپتیونین، ایزو-تریپتیونین، ترمتوپریم و سولفامتوکسازول، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (ایبوپروفن، ناپروکسین، دیکلوفنac، اندولولاک، ایندومناتاسین، کتوپروفن و...) به پزشک اطلاع دهید. • در صورت بارداری و یا تصعیم به بارداری و در دوران شیردهی، قبل از مصرف فرآورده با پزشک مشورت نماید. • در صورت اختلال کبدی یا کلیوی، با اختیاط و زیر نظر پزشک مصرف گردد. • در صورتی که یک نوبت مصرف فرآورده را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید. اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد از مصرف دو برابر آن خودداری نماید. • فرآورده را در ظرف اصلی خود نگهداری نماید. نگهداری فرآورده در ظروف شبیه ای باعث از بین رفتن برخی از مواد موثره آن می شود. • پس از مصرف، درب ظرف را محکم بینند.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

در دوران بارداری و شیردهی طبق دستور پزشک مصرف گردد.

قدار و نحوه مصرف:

بزرگسالان و افراد ۱۲ سال به بالا: روزی عدد قرص فرآورده را با مقداری آب و همراه غذا مصرف نماید.

عواض جانبی:

اگر همه این عوارض در یک فرد دیده نهی شود اما در صورت بروز هر یک از این مواد به پزشک خود اطلاع دهید: واکنشهای آلرژیک، بیوست، تیره شدن مدفع، تهوع، استفراغ، درد شکمی، کهیر، اشکال در تنفس، تورم در ناحیه صورت، لبه، زبان و یا گلو، سر درد، احساس طعم نامناسب در دهان.

مسنومیت:

در صورت مصرف بیش از حد و بروز علائم جدی، فرد مسنوم را سریعاً به بیمارستان منتقل کنید.

شرط نگهداری:

فرآورده را دور از نور و رطوبت و دردهای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید. فرآورده را دور از دید و دسترس اطفال نگهداری نمایید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها مولتی ویتامین و مینرال به همراه لوئین را به صورت قرص روکشدار با نام تجاری سنتوم[®] درون جعبه و به همراه برگه راهنمای عرضه می نماید.



SENTUM[®]

Multivitamin & Mineral With Lutein

سنتوم[®]

مولتی ویتامین و مینرال به همراه لوئین

شكل فرآورده: هر قرص روکشدار سنتوم[®] حاوی ویتامین ها و املاح معدنی زیر می باشد:

مواد معدنی:

کلسیم (بصورت کلسیم فسفات، کلسیم کربنات).....	162 میلی گرم
ویتامین C (آسکوربیک اسید).....	400 واحد
ویتامین D3 (کلریزین).....	30 واحد
ویتامین E (یعنی دایتون).....	25 میکروگرم
ویتامین K (فیتودایتون).....	1.5 میلی گرم
مینریم (بصورت مینریم اسید).....	100 میلی گرم
روی (بصورت زینک اکساید).....	7.5 میلی گرم
بور (بصورت سدیم بورات).....	20 میلی گرم
سس (بصورت سدیم سولفات).....	1 میلی گرم
منذکز (بصورت منذکز سولفات).....	2 میلی گرم
کروم (بصورت کروم ربیکل اکساید).....	120 میکروگرم
وانادیوم (بصورت سدیم پولیبیدات).....	75 میکروگرم
سیلیکون (بصورت کلرید سلیکون دی اکسید).....	80 میلی گرم
سیلیوم (بصورت سدیم سلنات).....	5 میکروگرم
نیکل (بصورت نیکل سولفات).....	10 میکروگرم
فلات (بصورت استانول کلراید).....	1 میلی گرم
و آنادیوم (بصورت سدیم متاآنادات).....	10 میکروگرم
سیلیکون (بصورت کلرید سلیکون دی اکسید).....	2 میلی گرم
سلیوم (بصورت سدیم سلنات).....	20 میکروگرم
	250 میکروگرم

سایر مواد:

لوئین.....

مواد مصرف:

کمک به سلامت عمومی بدن

• تأمین ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن سنتوم[®] حاوی ویتامین های مختلف و مواد معمول در مواد غذایی و منابع طبیعی دیگر موجود می باشد. همچنین این فرآورده جهت تأمین ویتامین ها و مواد معدنی که از طریق رژیم غذایی بدست نمی آیند و نیز در درمان افرادی که دچار کمبود ویتامین ها و مواد معدنی شده اند مانند ابتلا به برخی از بیماری ها، دوران بارداری و شیردهی، تغذیه نامناسب، مشکلات گوارشی و سیاری از موارد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

مشدادرها:

• این فرآورده حاوی آهن می باشد و مصرف بیش از حد آن می تواند منجر به مسمومیت با آهن شود لذا فرآورده را بیش از مقدار تجویز شده مصرف ننمایید (مکرر به تجویز پزشک). • به علت خطر مسمومیت با آهن برای اطفال، فرآورده را دور از دسترس اطفال نگهداری ننماید. • با توجه به مقدار آهن موجود در فرآورده، مصرف آن برای سرینین زیر ۱۲ سال مجاز نمی باشد. • مصرف همزمان این فرآورده با سایر فرآورده های حاوی ویتامین ها و مواد معدنی ممکن است باعث مسمومیت با ویتامین ها و املاح شود. • فولیک اسید موجود در این فرآورده می تواند بر روی تست های آزمایشگاهی مربوط به B12 تأثیر بگذارد لذا قبل از انجام تست به پزشک خود اطلاع دهید. • در صورت ابتلا به کمبود ویتامین B12 (آنهی پرینیشیوز)، مشکلات گوارشی یا مصرف فرآورده های حاوی الکل، قبل از شروع مصرف این فرآورده به پزشک پا داروساز خود اطلاع دهید. • مصرف این فرآورده به صورت هرتپ به اثر بخشی بهتران کمک می کند.